

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proporsi kejadian perdarahan *postpartum* di RSUP Dr. Mohammad Hoesin dan Rumah Sakit Islam Siti Khodijah Palembang Tahun 2018 sebanyak 67 (38,1%);
2. Terdapat hubungan yang signifikan antara usia ibu dengan kejadian perdarahan *postpartum*;
3. Terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan ibu dengan kejadian perdarahan *postpartum*;
4. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pekerjaan ibu dengan kejadian perdarahan *postpartum*;
5. Terdapat hubungan yang signifikan antara status gravida ibu dengan kejadian perdarahan *postpartum*;
6. Terdapat hubungan yang signifikan antara paritas dengan kejadian perdarahan *postpartum*;
7. Terdapat hubungan yang signifikan antara anemia dengan kejadian perdarahan *postpartum*;
8. Terdapat hubungan yang signifikan antara makrosomia kejadian perdarahan *postpartum*;
9. Terdapat hubungan antara riwayat abortus dengan kejadian perdarahan *postpartum* pada Rumah Sakit Rujukan di Kota Palembang;
10. Tidak terdapat kehamilan ganda sehingga tidak dapat dianalisis hubungan kehamilan ganda dengan kejadian perdarahan *postpartum* pada Rumah Sakit Rujukan di Kota Palembang
11. Faktor yang paling dominan berpengaruh dengan kejadian perdarahan *postpartum* adalah status anemia;
12. Distribusi *mapping* (pemetaan) kejadian perdarahan *postpartum* terbanyak berada di lokasi Kecamatan Ilir Barat I sebanyak 7 kasus.

## **5.2 Saran**

### **5.2.1 Bagi Rumah Sakit :**

Melakukan upaya pencegahan perdarahan *postpartum* seminimal mungkin dengan cara meningkatkan pelayanan, konseling, maupun penyuluhan pada ibu bersalin tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perdarahan *postpartum* dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan serta menambah bahan bacaan tentang faktor-faktor risiko perdarahan *postpartum*.

### **5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya :**

Perlu dilakukan penelitian selanjutnya dengan menggunakan data primer sehingga variabel yang secara teori mempengaruhi kejadian perdarahan *postpartum* dapat diteliti sehingga hasil penelitian pun bisa lebih jelas memberikan banyak informasi mengenai hubungan sebab akibat tentang risiko kejadian perdarahan *postpartum* dan untuk *mapping* diharapkan untuk dapat meneliti secara luas dan mendalam dengan studi kasus pada wilayah yang luas sehingga dapat menganalisa dan merancang pemetaan ibu hamil berisiko untuk mencegah komplikasi persalinan.