

JEI-Komunitas serangga hama padi rawa lebak

by 2018- Jei-komunitas Serangga Hama Padi Rawa Lebak

Submission date: 27-Mar-2023 11:40AM (UTC+0700)

Submission ID: 2047675806

File name: 2018-JEI-Komunitas_serangga_hama_padi_rawa_lebak.pdf (503.43K)

Word count: 8598

Character count: 38622

Komunitas serangga hama padi rawa lebak yang ditanam dengan berbagai jarak tanam

⁴
Paddy rice spacing and its impact on community of insect pest in fresh swamp ecosystems

Siti Herlinda^{1, 2, 3*}, Hesti Apryanti³, Susilawati^{2, 4}, Erise Anggraini^{1, 3}

⁵

¹Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya

³Jalan Palembang-Prabumulih KM. 32, Indralaya, Ogan Ilir 30662

²Pusat Unggulan Riset Pengembangan Lahan Suboptimal (PUR-PLSO), Universitas Sriwijaya

Jalan Pascasarjana Unsr, No. ⁶24 Bukit Besar, Palembang 30139

³Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya

Jalan Palembang-Prabumulih KM. 32, Indralaya, Ogan Ilir 30662

⁴Program Studi Agronomi, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya

Jalan Palembang-Prabumulih KM. 32, Indralaya, Ogan Ilir 30662

(diterima April 2018, disetujui Oktober 2018)

ABSTRAK

Jarak tanam padi mempengaruhi spesies dan populasi serangga hama. Jarak tanam lebih rapat ideal untuk habitat dan relung serangga hama. Penelitian ini bertujuan untuk mengobservasi perbandingan komunitas serangga hama padi rawa lebak yang ditanam dengan berbagai jarak tanam. Percobaan lapangan dilaksanakan pada padi di lahan rawa lebak seluas 15 ha yang ditanam dengan jarak tanam tegel (25 cm x 25 cm) dan jajar legowo pada berbagai kombinasi jarak (4:1, 5:1, 6:1, dan 7:1). Serangga hama diambil menggunakan jaring serangga. Semua spesies serangga hama yang ditemukan pada satu musim tanam padi pada penelitian ini adalah 27 spesies. Spesies yang dominan ditemukan pada padi fase vegetatif adalah *Oxya chinensis* (Thunberg), *Acrida turrita* (Linnaeus), *Nilaparvata lugens* (Stål), *Nephrotettix virescens* (Distant), dan *Cofana spectra* (Distant), sedangkan pada fase generatif didominasi oleh *Leptocoris acuta* (Fabricius) dan *Riptortus* sp. Populasi *N. lugens* dan *N. virescens* tidak dipengaruhi oleh jarak tanam. Populasi kedua jenis wereng tersebut rendah dan tidak menjadi hama utama di padi rawa lebak. Spesies serangga hama utama adalah *L. acuta* dan populasinya dipengaruhi oleh jarak tanam padi. Populasi hama lebih tinggi pada padi dengan jarak tanam yang lebih rapat, yaitu jajar legowo 6:1, 7:1, dan tegel dibandingkan dengan jajar legowo 4:1 dan 5:1. Untuk itu, jajar legowo 4:1 atau 5:1 sebaiknya diterapkan di sawah rawa lebak untuk menekan populasi fitofag agar tidak menjadi hama penting.

Kata kunci: generatif, jajar legowo, tegel, vegetatif

ABSTRACT

Rice spacing can affect the species and populations of insect pests. The closer spacing of rice are suitable for the habitats and niches of insect pests. This research was aimed to observe the community of insect pest on rice planted with various spacing regime. Field experiment was carried out on a-15 hectare rice field grown using various rice spacing: 'tegel' (25 cm x 25 cm) and legowo cropping of 4:1, 5:1, 6:1, and 7:1. Insect pests were collected using insect nets. All the insects found at a rice season were 27 species. The dominant species at vegetative stage of rice were *Oxya chinensis* (Thunberg), *Acrida turrita* (Linnaeus), *Nilaparvata lugens* (Stål), *Nephrotettix virescens* (Distant),

*Penulis korespondensi: Siti Herlinda. Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya, Jalan Palembang-Prabumulih KM. 32, Indralaya, Ogan Ilir 30662, Tel: 0711-580059; Faks: 0711-580276, Email: sitiherlinda@unsri.ac.id

and *Cofana spectra* (Distant), whereas at generative stage the dominated ones were *Leptocoris acuta* (Fabricius) and *Riptortus* sp. The populations of *N. lugens* and *N. virescens* were not proven to be affected by rice spacing. The population of the both planthoppers were low and they did not become a key pest at fresh swamp ecosystems. The key insect pests was *L. acuta* and its population were affected by the rice spacing. The population of *L. acuta* was higher at rice with a more dense spacing, those were legowo cropping of 6:1, 7:1, and 'tegel' compared to legowo cropping of 4:1 and 5:1. Therefore, legowo cropping of 4:1 or 5:1 should be applied at the fresh swamp ecosystems to decrease the insect pests population.

Key words: generative, legowo cropping, 'tegel', vegetative

PENDAHULUAN

13

Lahan rawa lebak merupakan lahan basah yang tidak dipengaruhi oleh pasang surut air laut, namun sangat dipengaruhi oleh pasang atau genangan air sungai, yaitu berupa banjir besar yang secara periodik minimal 3 bulan menggenangi wilayah setinggi 50 cm (Subagyo 2006). Luas lahan rawa lebak di Indonesia adalah 9,3 juta ha yang tersebar di Sumatra, Kalimantan, dan Papua (Mulyani & Sarwani 2013). Di Sumatra Selatan, luas areal rawa lebak adalah 278.436 ha yang ditanam padi, jagung, cabai, dan lai¹¹ain yang dapat dikelompokkan menjadi rawa lebak dangkal (tinggi genangan < 50 cm, lama genangan < 22 bulan), lebak tengahan (tinggi genangan 50–100 cm, lama genangan 3–6 bulan), dan lebak dalam (tinggi genangan > 100 cm, lama genangan > 6 bulan) (Subagyo 2006). Areal rawa lebak Sumatra Selatan yang telah dimanfaatkan untuk budi daya padi tersebut adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Ilir (OI), Musi Banyuasin (MUBA), Ogan Komering Ulu (OKU), dan Kabupaten Muara Enim. Kabupaten OKI dan OI merupakan daerah di Sumatra Selatan dengan lahan rawa lebak paling luas dan berpotensi tinggi yang luasnya mencapai 59.150 ha (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 2014).

Di rawa lebak di Sumatra Selatan, petani lokal melakukan teknik budi daya yang spesifik lokasi. Umumnya, mereka melakukan tanam pindah, yang dimulai dari pengolahan tanah yang maksimal (*full tillage*), penyemaian benih padi, lalu bibit berumur 7 hari dipindah tanamkan (*transplanting*) ke lahan (direbukkan) dan dibiarkan tumbuh selama 14 hari di sawah, yang akhirnya siap ditandur (Lakitan et al. 2018). Saat padi ditandur, umumnya petani lokal menggunakan jarak tanam tegel (25 cm x 25 cm).

Petani lokal saat ini telah mulai menggunakan jarak tanam jajar tanam legowo atau disingkat jarwo. Cara tanam jajar¹²legowo merupakan cara bertanam dengan jarak dua atau lebih baris padi dan satu baris yang dikosongkan. Penamaan jajar legowo 2:1, 3:1, 4:1, dan seterusnya¹³ didasarkan pada jumlah barisan padi, misalnya jajar legowo 2:1 adalah dua baris padi dan satu baris kosong, sedangkan jajar legowo¹⁴ adalah tiga baris padi dan satu baris kosong. Jarak antar baris 25 cm, jarak kosong/legowo 50 cm, dan jarak tanam dalam baris 12,5 cm. Budi daya jajar legowo bertujuan untuk memberi ruang padi untuk tumbuh leluasa sehingga sinar matahari maksimal didapat yang¹⁵airnya produktivitas dapat meningkat (Sohel et al. 2009; Salahuddin et al. 2009; Ikhwani et al. 2013; Satria 2017).

Jarak tanam padi jajar legowo dan tegel dapat mempengaruhi spesies serangga hama¹⁶g menghuninya (Triyono et al. 2017). Sistem jajar legowo merupakan sistem yang bertujuan untuk memanipulas¹⁷ata letak tanaman sehingga setiap rumpun padi menjadi tanaman pinggir. Tanaman padi yang berada dipinggir akan mendapatkan sinar matahari sehingga kondisi ini juga mempengaruhi populasi fitofag. Padi yang ditanam menggunakan sistem tegel memiliki rumpun yang padat dan tidak memiliki ruang kosong, kondisi ini sangat disukai oleh serangga fitofag. Spesies dari Ordo Homoptera, seperti kelompok wereng atau kutudaun lebih menyukai jarak tanam rapat (Basit 2012). Penerapan jajar legowo pada awalnya untuk¹⁸erah yang banyak serangan hama. Penanaman padi dengan tipe sistem jajar legowo merupakan pengelolaan jarak tanam dan pengaturan cara tanam sehingga diperoleh ruang tumbuh yang optimal bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, menciptakan lingkungan yang kurang sesuai bagi organisme penganggu tanaman (OPT),

serta memudahkan dalam melakukan perawatan tanaman.

Selain mempengaruhi spesies serangga hama, jarak tanam padi jajar legowo dan tegel dapat mempengaruhi populasi serangga hama padi. Jarak tanam yang lebih rapat apalagi di sawah, ditumbuhi tumbuhan liar yang dapat menyebabkan peningkatan populasi serangga karena iklim mikro, misalnya kelembaban meningkat dan suhu lebih rendah lebih disukai serangga hama (Pathak & Khan 1994). Namun, jajar legowo menyebabkan iklim mikro lebih sesuai untuk musuh alami serangga hama padi, dengan semakin berlimpahnya musuh alami dapat menekan populasi serangga hama (Effendi 2009). Penelitian ini bertujuan untuk mengobservasi perbandingan komunitas serangga hama padi rawa lebak yang ditanam dengan berbagai jarak tanam.

21

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilaksanakan di sentra sawah rawa lebak di Desa Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan, dari bulan Juni sampai 5 Oktober 2017. Identifikasi spesies serangga hama dilakukan di Laboratorium Entomologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya.

Persiapan lahan percobaan

Percobaan lapangan ini dilaksanakan pada lahan seluas 15 ha yang ditanam padi varietas Inpari 22 bersertifikat nomor induk: PdnQH.P/9.578.221 label ungu. Masing-masing 15 ha tersebut menerapkan jarak tanam yang berbeda-beda dan setiap petak perlakuan luasnya 1 ha yang masing-masing diulang tiga kali. 16 perlakuan-perlakuan tersebut adalah jarak tanam tegel (25 cm x 25 cm), dan jajar legowo (jarwo) 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, yang masing-masing 31 jar legowo memiliki jarak tanam dalam baris 30 cm x 10 cm, dan jarak tanam antar baris 40 cm. Penelitian ini dirancang menggunakan rancangan acak kelompok karena penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh jarak tanam terhadap spesies dan populasi serangga hama. Dasar pemilihan jarak tanam ini berdasarkan kebiasaan petani setempat.

Penanam padi dilakukan dengan cara tanam pindah yang diawali penyemaian benih

di pematang sawah. Pada saat bibit berumur 7 hari, bibit dipindah tanamkan (*transplanting*) di sawah yang tanahnya telah diolah. Setelah itu, bibit tersebut dibiarkan tumbuh selama 14 hari, kemudian siap ditandur atau ditanam sesuai jarak tanam masing-masing perlakuan.

Pemupukan dilakukan pada saat padi berumur 29 5 hari dengan menggunakan pupuk Nitrogen (N) dengan dosis 100 kg/ha. Pemupukan berikutnya 24 t padi berumur 30 hari menggunakan pupuk N dengan dosis 100 kg/ha dan NPK 50 kg/ha. Pada saat padi memasuki fase bunting dilakukan 28 abali pemupukan menggunakan pupuk KCl dengan dosis 50 kg/ha, 50 kg/ha N, dan 50 kg/ha NPK. Pemeliharaan padi dilakukan dengan menyiangi tumbuhan liar secara mekanik. Pengendalian serangga hama menggunakan bioinsektisida yang berbahan aktif *Beavueria bassiana* dan tidak menggunakan pestisida sintetik. Perbanyak bioinsektisida tersebut mengikuti metode Rizkie et al. (2017) dan formulasi bioinsektisida memodifikasi metode Herlinda et al. (2012). Budi daya padi mengikuti cara petani, yang biasanya melakukan penyemprotan bioinsektisida *B. bassiana* dengan dosis 2 l/ha. Penyemprotan dilakukan dengan interval dua minggu sekali yang dimulai saat padi berumur 14 hari setelah tanam (hst).

Pengambilan contoh serangga hama di lahan percobaan

Serangga hama dikumpulkan menggunakan jaring serangga dengan modifikasi metode Sunariah et al. (2016) dengan diameter jaring 30 cm dan panjang tangkai jaring 1,75 m. Pengambilan contoh serangga hama dilakukan sebanyak lima ayunan per petak (ha) yang menyebar di empat sudut petak dan satu di tengah petak. Contoh serangga hama diambil pada saat padi berumur 14, 28, 42, 56, 70, 84, dan 98 hst. 9

Setiap ayunan, serangga yang tertangkap dimasukkan dalam kantong plastik (ukuran 1 kg) yang telah diisi formalin 2% mengikuti metode Herlinda 9 et al. (2018). Lalu, contoh serangga tersebut dibawa ke laboratorium, disortasi, dan dibersihkan dari kotoran lainnya, serta dibilas dengan air untuk membersihkan spesimen dari larutan formalin. Spesies 27 yang telah bersih selanjutnya dimasukkan dalam botol vial yang telah diisi alkohol 70% untuk diidentifikasi hingga genus atau spesies. Identifikasi yang didasarkan

morfologi ini menggunakan buku petunjuk, antara lain Kalshoven (1981) dan Pathak & Khan (1994).

Analisa data


Data jumlah individu serangga hama yang tertangkap dibandingkan dengan antar perlakuan menggunakan analisis ragam (ANOVA), apabila ditemukan perbedaan pengaruh perlakuan maka dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil (BNT). Data jumlah spesies dan distribusi individu antar spesies dianalisis menggunakan indeks Shannon-Wiener, indeks kemerataan, dan dominansi (Magurran 1988).

HASIL

Semua spesies serangga hama yang ditemukan pada satu musim tanam padi pada penelitian ini adalah 27 spesies (Tabel 1–7). Spesies yang ditemukan pada padi umur 14 hst hanya 16 spesies dan terus bertambah seiring perkembangan padi hingga mencapai 27 spesies. Spesies yang dominan ditemukan dari kelompok belalang, wereng, dan walang sangit (Tabel 1 & Gambar 1). Spesies kelompok belalang yang dominan ditemukan pada padi 14 hst adalah *Oxya chinensis* (Thunberg) dan *Acrida turrita* (Linnaeus),

Tabel 1. Spesies dan populasi serangga hama di padi dengan berbagai jarak tanam pada umur 14 hst

No	Spesies serangga hama	Rata-rata populasi serangga hama (individu/5 ayunan)					F hitung	P value
		Tegel	Jarwo 4:1	Jarwo 5:1	Jarwo 6:1	Jarwo 7:1		
1.	<i>Oxya chinensis</i>	0	0,44	0,3	1,67	0,6	1,081	0,399
2.	<i>Acrida turrita</i>	0,33	0,22	0,2	0,33	0	0,579	0,682
3.	<i>Valanga nigricornis</i>	0	0	0,2	0	0	0,615	0,658
4.	<i>Atractomorpha</i> sp.	0,33	0	0	0	0	2	0,143
5.	<i>Atractomorpha crenulata</i>	0	0	0,1	0	0	0	0
6.	<i>Dicladispa armigera</i>	0	0	0	0,33	0	2	0,143
7.	<i>Chaetocnema kenyensis</i>	1,67	0,22	1,6	0,33	0	1,404	0,277
8.	<i>Aulachopora similis</i>	0	0	0	0	0	0	0
9.	<i>Gonocephalum</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0
10.	<i>Alphitobius</i> sp.	0	0	0,1	0	0	0,8	0,543
11.	<i>Chilo suppressalis</i>	0	0,11	0,2	0	0,6	1,045	0,415
12.	<i>Lepidoptera A</i>	0	0	0,1	0	0	0,8	0,543
13.	<i>Scirpophaga innotata</i>	0	0	0	0	0	0	0
14.	<i>Prays endocarpa</i>	0	0,44	0,1	0	0	0,25	0,905
15.	<i>Cnaphalocrosis medicinalis</i>	0	0,11	0,2	0	0	0,538	0,71
16.	<i>Nymphula depunctalis</i>	0	0	0,1	0	0	0	0
17.	<i>Utetheisa</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0
18.	<i>Atherigona oryzae</i>	0	0	0	0	0	1,318	0,306
19.	<i>Leptocoris acuta</i>	0	0,11	0	0	0	0,8	0,543
20.	<i>Riptortus</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0
21.	<i>Cofana spectra</i>	0	0,56	0,1	0	0,6	0,609	0,662
22.	<i>Nephrotettix virescens</i>	0	0	0,1	0	0	0,5	0,736
23.	<i>Nilaparvata lugens</i>	0	0,44	2,3	0	0,2	0,897	0,488
24.	<i>Nezara viridula</i>	0	0	0	0	0	0	0
25.	<i>Pentatomidae A</i>	0	0	0	0	0	0	0
26.	<i>Pentatomidae B</i>	0	0	0	0	0	0	0
27.	<i>Megachile</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0
	Total	2,33	2,65	5,7	2,66	2	0,849	0,515



Gambar 1. Populasi spesies fitofag don¹an yang ditemukan di padi dengan berbagai jarak tanam pada satu musim tanam. A: tegel; B: jajar legowo 4:1; C: jajar legowo 5:1; D: jajar legowo 6:1; E: jajar legowo 7:1.

sedangkan kelompok wereng didominasi oleh *Nilaparvata lugens* (Stål), *Nephrotettix virescens* (Distant), dan *Cofana spectra* (Distant). Data hasil populasi serangga hama pada padi 28 hst (Tabel 2) juga sejalan dengan data pada padi 14 hst. Populasi serangga hama berbeda tidak nyata di semua petak perlakuan jarak tanam baik padi umur 14 dan 28 hst.

Spesies serangga hama yang ditemukan pada padi 42 hst masih didominasi kelompok belalang, *O. chinensis* dan *A. turrita*, serta wereng, *N. lugens*, *N. virescens*, dan *C. spectra*. Pada padi 49 hst, populasi belalang dan wereng tersebut walau masih dominan, tetapi mulai mengalami penurunan (Tabel 3 dan 4). Spesies pengerek batang padi, antara lain *Chilo suppressalis* (Walker)

dan *Scirphophaga innotata* (Walker) dan pengisap buah padi, *Leptocorisa acuta* (Fabricius) mulai muncul pada padi 42 dan 56 hst, namun populasi kedua kelompok serangga hama tersebut masih rendah. Populasi serangga hama pada padi 42 dan 56 hst berbeda tidak nyata antar petak yang berbeda jarak tanam.

Pada padi 70 hst, jarak tanam yang berbeda antar perlakuan tidak mempengaruhi populasi serangga hama (Tabel 5). Kemunculan spesies serangga hama dipengaruhi oleh fenologi padi. Pada padi 70 hst ini, yang merupakan fase generatif yang ditandai mulainya pengisian bulir, populasi *L. acuta* meningkat tajam mencapai 6,4 individu/5 ayunan pada perlakuan jarak tanam jarwo 5:1. Populasi

Tabel 2. Spesies dan populasi serangga hama di padi dengan berbagai jarak tanam pada umur 28 hst

No. Spesies serangga hama	Rata-rata populasi serangga hama (individu/5 ayunan)					F hitung	P value
	Tegel	Jarwo 4:1	Jarwo 5:1	Jarwo 6:1	Jarwo 7:1		
1. <i>Oxya chinensis</i>	0	0,44	0	0,33	0,6	0,709	0,597
2. <i>Acrida turrita</i>	0,33	0,77	0,3	0,33	0,6	0,436	0,78
3. <i>Valanga nigricornis</i>	0	0,55	0,3	0	0	1,2	0,349
4. <i>Atractomorpa</i> sp.	0	0	0,2	0	0	0	0
5. <i>Atractomorpa crenulata</i>	0	0	0	0	0	0	0
6. <i>Dicladispa armigera</i>	0	0	0	0	0	2,682	0,69
7. <i>Chaetocnema kenyensis</i>	0	0,11	0,2	1	0	0	0
8. <i>Aulachopora similis</i>	0	0	0	0	0	1	0,436
9. <i>Gonocephalum</i> sp.	0	0	0	0	0,4	0	0
10. <i>Alphitobius</i> sp.	0	0	0	0	0	0,5	0,376
11. <i>Chilo suppressalis</i>	0	0,11	0,1	0	0	0	0
12. <i>Lepidoptera A</i>	0	0	0	0	0	0,5	0,376
13. <i>Scirpophaga innotata</i>	0	0	0,1	0	0	1,636	0,214
14. <i>Prays endocarpa</i>	0,33	0,66	0,5	0,33	0	0,857	0,51
15. <i>Cnapclorosis medinalis</i>	0	0,22	0	0	0,2	0	0
16. <i>Nymphula depunctalis</i>	0	0	0	0	0	1,2	0,349
17. <i>Utetheisa</i> sp.	0	0	0,2	0	0	1,467	0,259
18. <i>Atherigona oryzae</i>	0	0,22			0,6	2,25	0,109
19. <i>Leptocoris acuta</i>	0	0	0	0	0,6	0,5	0,376
20. <i>Riptortus</i> sp.	0	0	0,1	0	0	1,061	0,408
21. <i>Cofana spectra</i>	1	0,77	0,1	0,66	0,2	2	0,143
22. <i>Nephrotettix virescens</i>	0	0	0	0,33	0	1,246	0,331
23. <i>Nilaparvata lugens</i>	1,66	0	0,4	3,66	0,2	0	0
24. <i>Nezara viridula</i>	0	0	0	0	0	0	0
25. <i>Pentatomidae A</i>	0	0	0	0	0	0	0
26. <i>Pentatomidae B</i>	0	0	0	0	0	0	0
27. <i>Megachile</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0
Total	3,33	4,33	2,5	7	4	0,663	0,627

belalang pada padi 70 hst masih tetap tinggi, sedangkan populasi wereng tidak ditemukan lagi.

Pada padi 84 hst, populasi *L. acuta* terus meningkat dibandingkan dengan pengamatan sebelumnya, namun populasinya berbeda tidak nyata antar perlakuan. Hasil pengamatan menunjukkan populasi *Aulacophora similis* (Olivier) paling tinggi (3,33 individu/5 ayunan) ($F_{1,4} = 0,050$) pada petak perlakuan jarwo 6:1 tidak berbeda nyata dengan perlakuan tegel dan jarwo 7:1), namun berbeda nyata dibandingkan dengan populasi pada petak jarwo 4:1 dan 5:1 (Tabel 6). Hasil ini menunjukkan jarak tanam yang rapat dapat menyebabkan peningkatan populasi *A. similis*.

Pada padi 98 hst, spesies yang paling dominan ditemukan adalah pengisap buah padi, *L. acuta* dan *Riptortus* sp. Total populasi serangga hama paling tinggi pada petak jarwo 6:1 berbeda nyata dengan petak perlakuan tegel ($P = 0,012$), namun tidak berbeda nyata dengan petak perlakuan lainnya (Tabel 7). Penyumbang populasi paling tinggi pada petak jarwo 6:1 adalah *L. acuta*. Pada fase ini, spesies serangga hama lainnya menurun drastis dan serangga hama yang dominan hanya tersisa *L. acuta* dan *Riptortus* sp.

Selama satu musim tanam, terdapat enam spesies fitofag yang memiliki proporsi yang tinggi di padi yang ditanam berbagai jarak tanam (Tabel 8). Tiga spesies belalang, yaitu *O. chinensis*, *A.*

Tabel 3. Spesies dan populasi serangga hama di padi dengan berbagai jarak tanam pada umur 42 hst

No.	Spesies serangga hama	Rata-rata populasi serangga hama (individu/5 ayunan)					F hitung	P value
		Tegel	Jarwo 4:1	Jarwo 5:1	Jarwo 6:1	Jarwo 7:1		
1.	<i>Oxya chinensis</i>	0,66	0,33	0,4	1	0,2	0,406	0,802
2.	<i>Acrida turrita</i>	1	0,22	0,2	0,66	1,6	1,301	0,301
3.	<i>Valanga nigricornis</i>	0,666	0,22	1,1	0	0	2,344	0,099
4.	<i>Atractomorpha</i> sp.	0	0	0,1	0	0	0,5	0,736
5.	<i>Atractomorpha crenulata</i>	0	0	0,1	0	0	0,8	0,543
6.	<i>Dicladispa armigera</i>	0	0	0,1	0,33	0	0,8	0,543
7.	<i>Chaectocnema kenyensis</i>	0	0	0	0	0	0	0
8.	<i>Aulachopora similis</i>	0	0,11	0,1	0	0	0,118	0,974
9.	<i>Gonocephalum</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0
10.	<i>Alphitobius</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0
11.	<i>Chilo suppressalis</i>	0,33	0,44	0,1	0	0,6	0,306	0,87
12.	<i>Lepidoptera A</i>	0	0,111	0	0	0	0,5	0,736
13.	<i>Scirpophaga innotata</i>	0	0,333	0,5	0,33	0	0,337	0,849
14.	<i>Prays endocarpa</i>	0,66	0,22	0,2	1,66	0	2,246	0,11
15.	<i>Cnaphalocrosis medinalis</i>	0	0	0	0	0	0	0
16.	<i>Nymphula depunctalis</i>	0	0	0	0	0	0	0
17.	<i>Utetheisa</i> sp.	0	0,11	0	0	0	0,5	0,736
18.	<i>Atherigona oryzae</i>	0	0,33	0	0	0	0,8	0,543
19.	<i>Leptocoris acuta</i>	0	0,77	0,4	1	0,6	0,409	0,8
20.	<i>Riptortus</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0
21.	<i>Cofana spectra</i>	0,66	0,77	0,5	0	2,2	1,503	0,248
22.	<i>Nephrotettix virescens</i>	0	0	0	0	0,4	3,2	0,041
23.	<i>Nilaparvata lugens</i>	0	0,77	0,3	1,66	0	1,277	0,32
24.	<i>Nezara viridula</i>	0	0,22	0,1	0	0	0	0
25.	<i>Pentatomidae A</i>	0	0	0	0	0	0	0
26.	<i>Pentatomidae B</i>	0	0	0	0	0	0	0
27.	<i>Megachile</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0
	Total	4	5	4,2	6,66	5,6	0,953	0,46

turrita, dan *Valanga nigricornis* (Burmeister), dua spesies wereng, yaitu *N. virescens*, *N. lugens*, dan walang sangit *L. acuta*. Populasi *L. acuta* memiliki proporsi paling tinggi di setiap perlakuan padi. Dua spesies belalang *O. chinensis* dan *A. turrita* memiliki proporsi yang tinggi di padi yang ditanam terlalu rapat, yaitu tegel, jarwo 6:1, dan 7:1. Sementara itu, *N. lugens* lebih banyak ditemukan pada padi yang ditanam dengan sistem tegel.

Selama satu musim tanam padi, tampak adanya perubahan pada komunitas serangga hama mengikuti fase tanaman padi. Terdapat kecenderungan hampir di semua petak perlakuan,

yaitu terjadi peningkatan jumlah spesies, kelimpahan, dan keanekaragaman spesies serangga hama seiring dengan perkembangan tanaman padi (Tabel 9). Indeks keanekaragaman spesies serangga hama cenderung konsisten tinggi pada padi yang ditanam menggunakan jarak tanam jarwo 4:1, sedangkan di petak yang ditanam dengan jarak tanam tegel cenderung lebih rendah dibandingkan dengan jarak tanam lainnya. Pada saat padi umur 70 hst mulai ditemukan dominasi spesies yang tinggi di petak padi berjarak tanam jarwo 5:1 dan 6:1 dan kecenderungan ini terjadi hingga menjelang panen (98 hst).

Tabel 4. Spesies dan populasi serangga hama di padi dengan berbagai jarak tanam pada umur 56

No.	Spesies serangga hama	Rata-rata populasi serangga hama (individu/5 ayuanan)					F hitung	P value
		Tegel	Jarwo 4:1	Jarwo 5:1	Jarwo 6:1	Jarwo 7:1		
1.	<i>Oxya chinensis</i>	0,66	1,222	0,8	0,66	1,2	0,123	0,972
2.	<i>Acrida turrita</i>	0	0,33	1,1	1,66	1,4	0,315	0,045
3.	<i>Valanga nigricornis</i>	0	1,22	1,8	0	0	0,752	0,571
4.	<i>Atractomorpa</i> sp.	0,333	0,111	0	0	0	1,318	0,306
5.	<i>Atractomorpa crenulata</i>	0	0,111	0,1	0	0	0	1
6.	<i>Dicladispa armigera</i>	0	0	0	0	0	0	0
7.	<i>Chaectocnema kenyensis</i>	0	0,333	0,2	0,33	0,4	0,372	0,825
8.	<i>Aulachopora similis</i>	1	2	2,9	2	2,4	0,582	0,717
9.	<i>Gonocephalum</i> sp.	0,333	0,11	0	0	0	1,318	0,306
10.	<i>Alphitobius</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0
11.	<i>Chilo suppressalis</i>	0	0,222	0	0,333	0	1,6	0,223
12.	<i>Lepidoptera A</i>	0	0	0	0	0	0	0
13.	<i>Scirphophaga innotata</i>	0	0,111	0,1	0	0	0,225	0,903
14.	<i>Prays endocarpa</i>	0	0	0	0	0	0	0
15.	<i>Cnapclorosis medinalis</i>	0	0	0	0	0	0	0
16.	<i>Nymphula depunctalis</i>	0	0	0	0	0	0	0
17.	<i>Utetheisa</i> sp.	0	0	0,2	0	0	1,5	0,249
18.	<i>Atherigona oryzae</i>	0	0,111	0	0	0	0	0
19.	<i>Leptocoris acuta</i>	0	1,33	1,3	1	1	0,417	0,794
20.	<i>Riptortus</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0
21.	<i>Cofana spectra</i>	1	1,111	0,8	0,333	2	0,44	0,778
22.	<i>Nephrotettix virescens</i>	0	0,222	0,1	0	0,2	0,438	0,78
23.	<i>Nilaparvata lugens</i>	2	1	0	0	0	2,521	0,082
24.	<i>Nezara viridula</i>	0	0	0,1	0	0	0,8	0,543
25.	<i>Pentatomidae A</i>	0	0	0	0	0	0	0
26.	<i>Pentatomidae B</i>	0	0	0	0	0	0	0
27.	<i>Megachile</i> sp.	0	0	0	0	0	2	0,143
Total		14,88	19,05	15,83	14,93	23,321	2,364	0,097

PEMBAHASAN

Jarak tanam pada penelitian ini menunjukkan pengaruh saat populasi serangga hama tersebut tinggi. Serangga hama dari spesies *L. acuta*, *Riptortus* sp., dan *A. similis* umumnya signifikan lebih tinggi pada jarak tanam tegel dan jajar legowo 6:1 atau 7:1 dan lebih rendah pada jajar legowo 4:1 dan 5:1. Jarak tanam yang rapat lebih sesuai untuk habitat dan relung serangga hama (Parasappa et al. 2017). Basit (2012), menyatakan bahwa *Bemisia tabaci* (Gennadius) meningkat tajam pada jarak tanam mentimun yang lebih

rapat karena lebih sesuai untuk habitat dan relungnya.

Populasi serangga hama tidak berbeda nyata di semua petak perlakuan jarak tanam pada padi 14 dan 28 hst karena kondisi padi lahan rawa lebak masih tergenang air sehingga tidak sesuai untuk habitat dan relung serangga hama yang menyerang batang padi, seperti wereng coklat. Pertanaman padi yang tergenang air dapat menyulitkan serangga-serangga hama untuk menemukan tanaman relung pada batang padi tersebut.

Dari pengamatan langsung di ekosistem rawa lebak Sumatra Selatan, populasi wereng baik

Tabel 5. Spesies dan populasi serangga hama di padi dengan berbagai jarak tanam pada umur 70 hst

No.	Spesies serangga hama	Rata-rata populasi serangga hama (individu/5 ayunan)					F hitung	P value
		Tegel	Jarwo 4:1	Jarwo 5:1	Jarwo 6:1	Jarwo 7:1		
1.	<i>Oxya chinensis</i>	2	0,666	0,2	0,333	1,8	1,986	0,145
2.	<i>Acrida turrita</i>	0,333	0,888	0,4	0	1	0,714	0,594
3.	<i>Valanga nigricornis</i>	0,333	1,555	1,8	3	0	1,413	0,275
4.	<i>Atractomorpha</i> sp.	0	0,111	0	0	0	0,5	0,76
5.	<i>Atractomorpha crenulata</i>	0	0,111	0	0	0	0,5	0,76
6.	<i>Dicladispa armigera</i>	0	0	0	0	0	0	0
7.	<i>Chaectocnema kenyensis</i>	0	0	0	0	0	0	0
8.	<i>Aulachopora similis</i>	2,666	2,666	3,1	3,333	3,6	0,157	0,957
9.	<i>Gonocephalum</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0
10.	<i>Alphitobius</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0
11.	<i>Chilo suppressalis</i>	0	0	0	0	0	0	0
12.	<i>Lepidoptera A</i>	0	0	0	0	0	0	0
13.	<i>Scirphophaga innotata</i>	0,333	0	0	0	0	2	0,143
14.	<i>Prays endocarpa</i>	0	0	0	0	0	0	0
15.	<i>Cnapclorosis medinalis</i>	0	0	0	0	0	0	0
16.	<i>Nymphula depunctalis</i>	0	0	0	0	0	0	0
17.	<i>Utetheisa</i> sp.	0	0,222	0	0	0	0,5	0,736
18.	<i>Atherigona oryzae</i>	0,333	0	0	0	0	2	0,143
19.	<i>Leptocoris acuta</i>	4	3,666	6,4	5	5	2,695	0,068
20.	<i>Riptortus</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0
21.	<i>Cofana spectra</i>	0	1,333	1	1	0,4	1,109	0,386
22.	<i>Nephrotettix virescens</i>	0	0,222	0	0	0	1,122	0,381
23.	<i>Nilaparvata lugens</i>	0	0	0	0	0	0	0
24.	<i>Nezara viridula</i>	0	0	0	0	0	0	0
25.	<i>Pentatomidae A</i>	0	0	0,1	0	0	0	0
26.	<i>Pentatomidae B</i>	0	0	0	0	0	0	0
27.	<i>Megachile</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0
	Total	10	11,444	13	12,666	11,8	0,376	0,822

wereng batang coklat, wereng hijau, wereng zig-zag, dan lain-lain umumnya rendah. Banyak faktor penyebab rendahnya populasi wereng di ekosistem tersebut, antara lain indeks pertanaman padi hanya satu kali setahun (IP 100) dan penggunaan pestisida sintetik masih rendah. IP 100 umumnya terjadi di ekosistem sawah rawa lebak karena petani sulit mengendalikan air saat musim hujan dan pasang air sungai. Periode waktu tanam di rawa lebak berkisar bulan Mei hingga September, setelah itu lahan akan tergenang air pasang selama 6–7 bulan yang dimulai bulan Oktober hingga April. Pada kondisi tergenang air pasang, petani lokal tidak bertanam padi dan lahan dibiarkan

tanpa ditanami atau hanya diberakan. Kondisi inilah yang menyebabkan putusnya siklus hidup serangga hama monofag atau oligofag, seperti wereng coklat. Untuk serangga hama kelompok pengisap bulir padi, seperti walang sangit, banyak yang bertahan hidup di tumbuhan liar jenis *Panicum* sp. dan *Andropogon sorgum* saat padi diberakan di ekosistem rawa lebak sehingga populasi serangga hama walang sangit selalu tinggi pada saat tanaman padi ditanam.

Selain itu, petani lokal di rawa lebak Sumatra Selatan umumnya petani dengan modal usaha yang rendah sehingga sangat jarang yang mampu membeli pestisida sintetik. Kebiasaan ini sangat

Tabel 6. Spesies dan populasi serangga hama di padi dengan berbagai jarak tanam pada umur 84 hst

No. Spesies serangga hama	Rata-rata populasi serangga hama (individu/5 ayunan)					F hitung	P value	BNJ 5%
	Tegel	Jarwo 4:1	Jarwo 5:1	Jarwo 6:1	Jarwo 7:1			
1. <i>Oxya chinensis</i>	0,66	0,33	0,1	0,333	1,2	0,812	0,536	
2. <i>Acrida turrita</i>	0	0,77	0,5	1,333	0,2	0,762	0,565	
3. <i>Valanga nigricornis</i>	0	0,111	1,3	0,667	0	1,629	0,216	
4. <i>Atractomorpha</i> sp.	0	0,88	0,6	0	0	0,351	0,839	
5. <i>Atractomorpha crenulata</i>	0	0	0	0	0	0	0	
6. <i>Dicladispa armigera</i>	0	0	0	0	0	0	0	
7. <i>Chaetocnema kenyensis</i>	0	0,11	0	0	0	0,8	0,543	
8. <i>Aulachopora similis</i>	2,67 ab	0,6 a	0,1 a	3,33 b	1 ab	2,973	0,050	2,61
9. <i>Gonocephalum</i> sp.	0	0,11	0	0	0	0,5	0,736	
10. <i>Alphitobius</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	
11. <i>Chilo suppressalis</i>	0	0,22	0,1	0,34	0	1,143	0,372	
12. <i>Lepidoptera A</i>	0	0	0	0	0	0	0	
13. <i>Scirpophaga innotata</i>	0	0	0,1	0	0	0,615	0,658	
14. <i>Prays endocarpa</i>	0	0	0	0	0	0	0	
15. <i>Cnapclorosis medinalis</i>	0	0	0	0	0	0	0	
16. <i>Nymphula depunctalis</i>	0	0	0	0	0	0	0	
17. <i>Utetheisa</i> sp.	0	0,11	0,1	0,67	0	1,347	0,296	
18. <i>Atherigona oryzae</i>	0	0	0	0	0	0	0	
19. <i>Leptocoris acuta</i>	3,66	7,66	6,6	4,67	6	0,422	0,79	
20. <i>Riptortus</i> sp.	0	0	0,2	0	0	1,122	0,381	
21. <i>Cofana spectra</i>	0	0,44	0,2	0,34	1,6	1,538	0,239	
22. <i>Nephrotettix virescens</i>	0	0	0	0	0	0	0	
23. <i>Nilaparvata lugens</i>	0	0	0	0	0	0	0	
24. <i>Nezara viridula</i>	0	0	0	0	0	0	0	
25. <i>Pentatomidae A</i>	0	0	0	0	0	0	0	
26. <i>Pentatomidae B</i>	0	0	0,1	0	0	0,615	0,658	
27. <i>Megachile</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	
Total	7	11	10	12	10	0,756	0,569	

menguntungkan ekosistem rawa lebak karena dapat menyebabkan kelimpahan yang tinggi untuk predator wereng. Dari hasil survei Khodijah et al. (2012), menemukan predator wereng di rawa lebak, antara lain *Pardosa pseudoannulata* (Bösenberg & Strand), *Pardosa sumatrana* (Thorell), *Pheropsophus occipitalis* (W.S.MacLeay), dan *Paederus fuscipes* Curtis.

O. chinensis dan *A. turrita* dominan ditemukan pada padi 14 dan 28 hst karena kondisi pertanaman padi di lahan yang berdekatan dengan tumbuhan liar. Kedua jenis belalang tersebut bersifat polifag dan dapat berpindah dari tumbuhan liar di sekitar pertanaman padi ke petak perlakuan padi. Serangga

hama yang bersifat polifag dapat berpindah ke tumbuhan inang yang memiliki nilai nutrisi yang lebih baik sehingga bila di sekitar habitat tersebut ditemukan padi maka mereka akan pindah ke padi atau tanaman dan meninggalkan tumbuhan liar (Parasappa et al. 2017).

N. lugens, *N. virescens*, dan *C. spectra* juga dominan ditemukan pada padi 14 dan 28 hst karena pada fase tersebut padi pada fase anakan yang memiliki pertumbuhan yang baik dengan batang dan daun padi telah tumbuh sempurna. Pada fase ini, padi mengalami pertumbuhan sangat aktif, memiliki banyak anakan primer dan sekunder (Tripathi et al. 2011). Pathak & Khan

Tabel 7. Spesies dan populasi serangga hama di padi dengan berbagai jarak tanam pada umur 98 hst

No. Spesies serangga hama	Rata-rata populasi serangga hama (individu/5 ayunan)					F hitung	P value	BNJ 5%
	Tegel	Jarwo 4:1	Jarwo 5:1	Jarwo 6:1	Jarwo 7:1			
1. <i>Oxya chinensis</i>	0	0,111	0,1	0,666	0,2	0,819	0,532	
2. <i>Acrida turrita</i>	0	0,333	0,4	1,666	1,2	1,218	0,342	
3. <i>Valanga nigricornis</i>	0	0,333	0,9	0,333	0	0,737	0,58	
4. <i>Atractomorpha</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	
5. <i>Atractomorpha crenulata</i>	0	0	0	0	0	0	0	
6. <i>Dicladispa armigera</i>	0	0	0	0	0	0	0	
7. <i>Chaectocnema kenyensis</i>	0	0	0	0	0	0	0	
8. <i>Aulachopora similis</i>	0	0	0,6	0	0,4	1,463	0,26	
9. <i>Gonocephalum</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	
10. <i>Alphitobius</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	
11. <i>Chilo suppressalis</i>	0	0	0	0	0	0	0	
12. <i>Lepidoptera A</i>	0	0	0	0	0	0	0	
13. <i>Scirpophaga innotata</i>	0	0	0	0	0	0	0	
14. <i>Prays endocarpa</i>	0	0	0	0	0	0	0	
15. <i>Cnapclorosis medinalis</i>	0	0	0	0	0	0	0	
16. <i>Nymphula depunctalis</i>	0	0	0	0	0	0	0	
17. <i>Utetheisa</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	
18. <i>Atherigona oryzae</i>	0	0	0	0	0	0	0	
19. <i>Leptocoris acuta</i>	0	0	5,3	6,333	2	3,021	0,049	
20. <i>Riptortus</i> sp.	0	2	0	2	0	1,318	0,306	
21. <i>Cofana spectra</i>	0	0,666	0,4	0	0	0,884	0,496	
22. <i>Nephrotettix virescens</i>	0	0,222	0	0	0	0,615	0,58	
23. <i>Nilaparvata lugens</i>	0	0,111	0	0	0	0	0	
24. <i>Nezara viridula</i>	0	0	0	0	0	0	0	
25. <i>Pentatomidae A</i>	0	0	0	0	0	0	0	
26. <i>Pentatomidae B</i>	0	0	0	0	0	0	0	
27. <i>Megachile</i> sp.	0	0	0	0	0	0	0	
Total	0a	3,8 ab	7,7 ab	11 b	3,8 ab	4,518	0,012	8,25

(1994) menyatakan bahwa pada fase pertumbuhan vegetatif seperti itu, kandungan nutrisi tanaman padi sangat sesuai untuk kelompok wereng daun dan batang. *N. virescens* dan *C. spectra* yang dikenal sebagai *leafhopper* menghisap cairan pada daun padi, sedangkan *N. lugens* yang dikenal sebagai *planthopper* menghisap cairan pada batang padi. Kemampuan serangga hama menemukan tanaman inang yang sesuai ini dipengaruhi oleh sensitifitas indra visual, penciuman maupun rabaan (Schoonhoven et al. 1998; Kalberer et al. 2005; Fischer et al. 2004).

Pada padi 35 dan 49 hst masih didominasi *N. lugens*, *N. virescens*, dan *C. spectra* karena pada

saat itu padi masih pada fase vegetatif, yaitu fase pemanjangan batang. Pada fase itu, jumlah anakan padi terus meningkat tanpa adanya penuaan daun (Tripathi et al. 2011). Nimfa dan imago *N. lugens* menghisap cairan jaringan floem pada batang anakan padi, sedangkan *N. virescens* menghisap jaringan faskular pada daun (Dey 2016). Settle et al. (1996) menyatakan bahwa populasi wereng di pertanaman padi dipengaruhi juga oleh fisiologi tanaman atau nutrisi tanaman padi. Populasi wereng melimpah pada tanaman padi saat fase anakan dan mulai muncul pengisap buah padi *L. acuta*, walaupun padi masih fase vegetatif karena di sekitar pertanaman padi terdapat tumbuhan

Tabel 8. Komposisi spesies serangga hama padi selama satu musim tanam

No. Spesies serangga hama	Tegel	Proporsi serangga hama (%)			
		Jarwo 4:1	Jarwo 5:1	Jarwo 6:1	Jarwo 7:1
1. <i>Oxya chinensis</i>	13,59	7,20	3,71	8,94	10,23
2. <i>Acrida turrita</i>	6,82	6,52	6,05	10,70	10,58
3. <i>Valanga nigricornis</i>	3,41	8,58	14,44	7,15	0
4. <i>Atractomorpha</i> sp.	2,26	3,37	1,76	0	0
5. <i>Atractomorpha crenulata</i>	0	0,45	0,59	0	0
6. <i>Dicladispa armigera</i>	0	0	0,20	1,18	0
7. <i>Chaectocnema kenyensis</i>	5,70	1,35	3,90	2,97	0,71
8. <i>Aulachopora similis</i>	12,52	9,95	13,08	9,54	11,28
9. <i>Gonocephalum</i> sp.	1,14	0,45	0	0	0,71
10. <i>Alphitobius</i> sp.	0,00	0	0,20	0	0
11. <i>Chilo suppressalis</i>	1,13	2,02	0,98	1,20	2,12
12. <i>Lepidoptera A</i>	0,00	0,45	0,20	0	0
13. <i>Scirpophaga innotata</i>	1,14	0,90	1,56	0,59	0
14. <i>Prays endocarpa</i>	3,39	1,34	1,56	3,57	0
15. <i>Cnaphalocrosis medinalis</i>	0	1,58	0,39	0	0,35
16. <i>Nymphula depunctalis</i>	0	0,45	0,20	0	0
17. <i>Utetheisa</i> sp.	0	0,90	0,98	1,20	0
18. <i>Atherigona oryzae</i>	1,14	0,90	0	0	1,06
19. <i>Leptocoris acuta</i>	26,16	28,00	39,04	32,20	26,80
20. <i>Riptortus</i> sp.	0,00	4,07	0,59	3,58	0
21. <i>Cofana spectra</i>	9,08	9,93	6,05	4,18	12,34
22. <i>Nephrotettix virescens</i>	0,00	2,94	0,39	0,60	1,06
23. <i>Nilaparvata lugens</i>	12,52	4,72	5,86	9,53	0,71
24. <i>Nezara viridula</i>	0	0,45	0,39	0	0
25. <i>Pentatomidae A</i>	0	0	0,20	0	0
26. <i>Pentatomidae B</i>	0	0	0,20	0	0
27. <i>Megachile</i> sp.	0	0	0	0	0
Total	100	100	100	100	100

liar dari Famili Graminae yang merupakan inang alternatif *L. acuta*. *L. acuta* banyak ditemukan pada pertanaman padi yang ditanami tumbuhan liar.

Pengerek batang padi, *C. supressalis* dan *S. innotata* mulai muncul pada padi 35 dan 49 hst karena pada fase itu padi telah mengalami fase pemanjangan batang yang berkembang sangat baik. Imago pengerek batang muncul ke pertanaman padi untuk berkembangbiak. Imago *S. innotata* meletakkan telur pada daun padi pada fase anakan, sedangkan imago *C. supressalis* meletakkan telur pada bagian bawah daun padi pada stadia vegetatif dan generatif.

Populasi *L. acuta* meningkat tajam pada padi 63 hst karena pada waktu itu padi mulai berbunga

dan berbuah. Buah padi merupakan makanan utama dari *L. acuta*. Pathak & Khan (1994) menyatakan bahwa populasi pengisap buah padi meningkat saat padi mulai berbunga, cuaca hangat yang memiliki suhu 27–28 °C dan kelembapan 80–82 serta curah hujan yang rendah. Populasi belalang pada padi 63 hst masih tetap tinggi karena usia padi pada saat itu masih dapat memungkinkan sebagai makanan belalang. Disisi lain, populasi wereng tidak ditemukan lagi karena faktor makanannya sudah tidak tersedia, hal ini karena padi sudah memasuki stadia generatif dimana fase pembungaan telah dimulai dan menyebabkan daun mengalami penuaan dan menguning (Tripathi et al. 2011). Populasi wereng secara signifikan berubah

Tabel 9. Karakteristik komunitas serangga hama di padi dengan berbagai jarak tanam

Karakteristik komunitas	Pola tanam				
	Tegel	Jarwo 4:1	Jarwo 5:1	Jarwo 6:1	Jarwo 7:1
Umur padi 14 hst					
Indeks keanekaragaman (H')	0,80	2,03	1,77	0,780	1,31
Indeks kemerataan (E)	1,30	3,37	2,32	1,28	2
Indeks dominasi (d)	0,72	0,21	0,40	0,62	0,30
Jumlah spesies (S)	3	9	13	3	4
Jumlah Individu (N) (individu/5 ayunan)	2,33	2,65	5,7	2,66	2
Umur padi 28 hst					
Indeks keanekaragaman (H')	0,95	1,90	1,88	1,44	0,95
Indeks kemerataan (E)	1,2	2,18	4,4	1,05	2,5
Indeks dominasi (d)	0,50	0,18	0,20	0,52	0,15
Jumlah spesies (S)	4	8	11	7	6
Jumlah Individu (N) (individu/5 ayunan)	3,33	4,33	2,5	7	4
Umur padi 42 hst					
Indeks keanekaragaman (H')	1,74	2,23	2,19	1,70	1,51
Indeks kemerataan (E)	1,5	2,63	3	0,94	1,07
Indeks dominasi (d)	0,25	0,15	0,26	0,25	0,39
Jumlah spesies (S)	6	12	12	6	6
Jumlah Individu (N) (individu/5 ayunan)	4	5	4,2	6,66	5,6
Umur padi 56 hst					
Indeks keanekaragaman (H')	1,20	2,10	1,95	1,42	1,45
Indeks kemerataan (E)	1	1,70	1,6	1,25	0,86
Indeks dominasi (d)	0,13	0,06	0,18	0,11	0,10
Jumlah spesies (S)	4	12	11	5	5
Jumlah Individu (N) (individu/5 ayunan)	14,88	19,05	15,83	14,93	23,321
Umur padi 70 hst					
Indeks keanekaragaman (H')	1,11	1,68	1,03	1,17	1,03
Indeks kemerataan (E)	0,71	1,02	0,51	0,51	0,48
Indeks dominasi (d)	0,27	0,32	0,49	0,39	0,30
Jumlah spesies (S)	5	9	5	5	4
Jumlah Individu (N) (individu/5 ayunan)	10	11,44	13	12,67	11,8
Umur padi 84 hst					
Indeks keanekaragaman (H')	0,42	1,05	1,20	1,51	0,93
Indeks kemerataan (E)	0,46	0,75	1,02	0,92	0,44
Indeks dominasi (d)	0,52	0,69	0,66	0,39	0,16
Jumlah spesies (S)	2	8	10	8	4
Jumlah Individu (N) (individu/5 ayunan)	7	11	10	12	10
Umur padi 98 hst					
Indeks keanekaragaman (H')	0	1,44	0,86	1,18	0,84
Indeks kemerataan (E)	0	1,85	0,70	0,45	0,88
Indeks dominasi (d)	0	0,18	0,69	0,57	0,52
Jumlah spesies (S)	0	7	5	5	3
Jumlah Individu (N) (individu/5 ayunan)	0	3,8	7,7	11	3,8

selama fase pertumbuhan padi hal ini disebabkan oleh adanya perubahan faktor fisiologis tanaman pada awal fase anakan sampai fase matang susu (Moldenhauer & Slaton 2004).

A. similis merupakan serangga hama yang menyerang mentimun yang ada di pematang sawah yang bermigrasi ke tanaman padi. Tingginya

populasi *A. similis* pada padi 77 hst disebabkan oleh serangga hama tersebut pindah dari tanaman mentimun yang ditanam di pematang sawah. Pertanaman mentimun ditanam serempak dengan pertanaman padi sehingga pertumbuhan padi dan mentimun sama. Saat memasuki fase vegetatif yang memiliki banyak daun, *A. similis* yang

merupakan hama pemakan daun mentimun juga meningkat dan tertangkap di pertanaman padi.

Populasi *L. acuta* dan *Riptortus* sp. merupakan pengisap buah padi (Pathak & Khan 1994). Bila dikaitkan dengan indeks dominasi spesies pada Tabel 8, data menunjukkan peningkatan dominasi spesies *L. acuta* mulai terjadi sejak 70 hst hingga menjelang panen di petak yang berjarak tanam jarwo 5:1 dan 6:1. Spesies tersebut masih dominan ditemukan karena kondisi pertanaman padi yang masih sesuai untuk perkembangbiakan jenis hama tersebut. Padi berumur 70–91 hst memiliki bulir padi yang merupakan pakan dari penghisap buah padi. Selain itu, kondisi lingkungan di sekitar pertanaman padi dengan jarak tanam rapat ditambah dengan banyaknya tumbuh-tumbuhan liar menyebabkan iklim mikro yang lembap dan teduh (suhu rendah) yang disukai kepik pengisap bulir padi (Pathak & Khan 1994).

KESIMPULAN

Spesies serangga hama yang dominan ditemukan pada fase vegetatif adalah *N. lugens*, *N. virescens*, dan *C. spectra*, sedangkan pada fase generatif didominasi oleh *L. acuta*, namun populasi ketiga spesies wereng tersebut tidak setinggi populasi *L. acuta*. Populasi serangga hama lebih tinggi pada padi dengan jarak tanam yang lebih rapat, yaitu jajar legowo 6:1, 7:1, dan tegel dibandingkan dengan jajar legowo 4 : 1 dan 5:1. Untuk itu, jajar legowo 4:1 atau 5:1 sebaiknya diterapkan di sawah rawa lebak untuk menekan populasi fitofag agar tidak menjadi hama penting.

UCAPAN TERIMA KASIH

³ Penelitian ini dibiayai oleh Program Hibah Kompetensi (HIKOM) Tahun Anggaran 2017 sesuai Surat Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Nomor: 025/E3/2017, tanggal 6 Januari 2017 yang diketua oleh Siti Herlinda.

DAFTAR PUSTAKA

- Basit M, Sayyed AH, Saeed S, Saleem MA. 2012. Lack of fitness costs associated with acetamiprid resistance in *Bemisia tabaci* (Hemiptera: Aleyrodidae). *Journal of Economic Entomology* 105:1401–1406. doi: <https://doi.org/10.1603/EC11196>.
- Dey SR. 2016. Green leafhopper (GLH), *Nephrotettix virescens* (Distant) and rice tungro disease (RTD). *The Beats of Natural Sciences* 3:1–7.
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. 2014. *Laporan Tahunan*. Palembang: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan.
- Effendi BS. 2009. Strategi pengendalian hama terpadu tanaman padi dalam perspektif praktik pertanian yang baik (*good agricultural practices*). *Pengembangan Inovasi Pertanian* 2:65–78.
- Fischer S, Samietz J, Wäckers FL, Dorn S. 2004. Perception of chromatic cues during host location by the pupal parasitoid *Pimpla turionellae* (L.) (Hymenoptera: Ichneumonidae). *Environmental Entomology* 33:81–87. doi: <https://doi.org/10.1603/0046-225X-33.1.81>.
- Herlinda S, Darmawan KA, Firmansyah F, Adam T, Irsan C, Thalib R. 2012. Bioesai bioinsektisida *Beauveria bassiana* dari Sumatra Selatan terhadap kutu putih pepaya, *Paracoccus marginatus* Williams & Granara De Willink (Hemiptera: Pseudococcidae). *Jurnal Entomologi Indonesia* 9:81–87. doi: <https://doi.org/10.5994/jei.9.2.81>.
- Herlinda S, Yudha S, Thalib R, Khodijah, Suwandi, Lakitan BM, Verawaty. 2018. Species richness and abundance of spiders inhabiting rice in fresh swamps and tidal lowlands in South Sumatra, Indonesia. *Journal of ISSAAS* 24:82–93.
- Ikhwani GR, Pratiwi, Paturrohman E, Makarim AK. 2013. Peningkatan produktivitas padi melalui penerapan jarak tanam jajar legowo. *Iptek Tanaman Pangan* 8:72–79.
- Kalberer NM, Turlings TCJ, Rahier M. 2005. An alternative hibernation strategy involving sunexposed “hotspots”, dispersal by flight, and host plant finding by olfaction in an alpine leaf beetle. *Entomologia Experimentalis et Applicata* 114:189–196. doi: <https://doi.org/10.1111/j.1570-7458.2005.00244.x>.
- Kalshoven LGE. 1981. *Pests of Crops in Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Khodijah, Herlinda S, Irsan C, Pujiastuti Y, Thalib R. 2012. Arthropoda predator penghuni ekosistem

- persawahan lebak dan pasang surut Sumatra Selatan. *Jurnal Lahan Suboptimal* 1:57–63.
- Lakitan B, Alberto A, Lindiana L, Kartika K, Herlinda S, Kurnianingsih A. 2018. The benefits of biochar on rice growth and yield in tropical riparian wetland, South Sumatra, Indonesia. *Chiang Mai University Journal of Natural Sciences* 17:111–126. doi: <https://doi.org/10.12982/CMUJNS.2018.0009>.
- Moldenhauer K, Slaton N. 2004. *Rice growth and development*. Di dalam: Slaton N, Ford L, Bernhardt J, Cartwright R, Gardisser D (Eds.) *Rice Production Handbook*. hlm. 7–14. Kansas: University of Kansas, Division of Agriculture, Cooperative Extension Service, Little Rock, USA.
- Magurran AE. 1988. *Ecological Diversity and its Measurement*. London: Chapman and Hall. doi: <https://doi.org/10.1007/978-94-015-7358-0>.
- Mulyani A, Sarwani M. 2013. Karakteristik dan potensi lahan sub optimal untuk pengembangan pertanian di Indonesia. *Jurnal Sumberdaya Lokal* 7:47–55.
- Parasappa HH, Narasa Reddy G, Avinash TG, Thara KT. 2017. Seasonal abundance of rice sucking pests under different rice ecosystems in Cauvery command areas of Karnataka. *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry* 6:1645–1648.
- Pathak MD, Khan ZR. 1994. *Insect Pests*. Manila: The International Rice Research Institute (IRRI).
- Rizkie L, Herlinda S, Suwandi, Irsan C, Susilawati, Lakitan B. 2017. Kerapatan dan viabilitas konidia *beauveria bassiana* dan *metarhizium anisopliae* pada media in vitro ph rendah. *Jurnal HPT Tropika* 17:119–127. doi: <https://doi.org/10.23960/j.hptt.217119-127>.
- Salahuddin KM, Chowhdury SH, Munira S, Islam MM, Parvin S. 2009. Response of nitrogen and plant spacing of transplanted Aman rice. *Bangladesh Journal of Agricultural Research* 34:279–285. doi: <https://doi.org/10.3329/bjar.v34i2.5801>.
- Satria B, Harahap EM, Jamilah. 2017. Peningkatan produktivitas padi sawah (*Oryza sativa* L.) melalui penerapan beberapa jarak tanam dan sistem tanam. *Jurnal Agroekoteknologi* 5:629–637.
- Schoonhoven LM, Jermy T, van Loon JJA. 1998. Host-plant selection: how to find a host plant. Di dalam: Schoonhoven LM, Jermy T, VAN Loon JJA(Eds.) *Insect-Plant Biology: From Physiology to Evolution*. hlm. 121–153. London: Chapman & Hall. doi: https://doi.org/10.1007/978-1-4899-3200-6_5.
- Settle WH, Ariawan H, Cahyana AETAS, Hakim AL, Hindayana D, Lestari AS, Pajarninsih, Sartanto. 1996. Managing tropical rice pests through conservation of generalist natural enemies and alternative prey. *Ecology* 77:1975–1988. doi: <https://doi.org/10.2307/2265694>.
- Sohel MAT, Siddique MAB, Asaduzzaman M, Alam MN, Karim MM, 2009. Varietal performance of transplant Aman rice under different hill densities. *Bangladesh Journal of Agricultural Research* 34:33–39. doi: <https://doi.org/10.3329/bjar.v34i1.5750>.
- Subagyo H. 2006. Lahan rawa lebak. Di dalam: *Buku Karakteristik dan Pengelolaan Lahan Rawa*. hlm. 99–116. Bogor: Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian.
- Sunariah F, Herlinda S, Irsan C, Windusari Y. 2016. Kelimpahan dan kekayaan arthropoda predator pada tanaman padi yang diaplikasi bioinsektisida *Bacillus thuringiensis*. *Jurnal HPT Tropika* 16: 42–50. doi: <https://doi.org/10.23960/j.hptt.11642-50>.
- Tripathi KK, Warrier R, Govila OP, Abuja V. 2011. *Biology of Oryza sativa L. (rice)*. New Delhi: Ministry of Environment and Forest of India.
- Triyono, Suhartini, Triatmanto. 2017. Pengaruh pola tanam padi (*Oryza sativa* L.) kultivar Ciherang terhadap keanekaragaman jenis hama di kelompok tani Sedyo Maju Desa Jogotirto. *Jurnal Prodi Biologi* 6:416–422.



PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|--|------|
| 1 | Octavia Rizky Prasetyo, Kadir Kadir. "TEKNIK PENANAMAN JAJAR LEGOWO UNTUK PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PADI SAWAH DI JAWA TENGAH", Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan, 2019
Publication | 1 % |
| 2 | Dia Novita Sari, Sumardi Sumardi, Eko Suprijono. "Pengujian Berbagai Tipe Tanam Jajar Legowo terhadap Hasil Padi Sawah", Akta Agrosia, 2014
Publication | 1 % |
| 3 | Lilian Rizkie, Siti Herlinda, Suwandi ., Chandra Irsan, Susilawati ., Benyamin Lakitan. "KERAPATAN DAN VIABILITAS KONIDIA BEAUVERIA BASSIANA DAN METARHIZIUM ANISOPLIAE PADA MEDIA IN VITRO PH RENDAH", JURNAL HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN TROPIKA, 2017
Publication | 1 % |
| 4 | Hasbi, T Tunggal, S Herlinda, C Irsan, R M Huljanna. "Application of pumping and rice | <1 % |

planting patterns to improve the productivity of fresh water swampy rice fields in South Sumatra, Indonesia", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021

Publication

-
- 5 Riyanto Riyanto, Siti Herlinda, Chandra Irsan, Abu Umayah. "KELIMPAHAN DAN KEANEKARAGAMAN SPESIES SERANGGA PREDATOR DAN PARASITOID *Aphis gossypii* DI SUMATERA SELATAN", Jurnal Hama dan Penyakit Tumbuhan Tropika, 2011 <1 %
- Publication
-
- 6 Ferdinand Hukama Taqwa, Ade Dwi Sasanti, Khadiful Haramain, Eni Kusrini, Abdul Karim Gaffar. "PENAMBAHAN KALSIUM PADA AIR RAWA SEBAGAI PENGENCER SALINITAS MEDIA PEMELIHARAAN PASCALARVA UDANG GALAH TERHADAP SINTASAN, TINGKAT KERJA OSMOTIK, DAN KONSUMSI OKSIGEN", Jurnal Riset Akuakultur, 2014 <1 %
- Publication
-
- 7 Mergono Adi Ningrat, Carolina Diana Mual, Yohanis Yan Makabori. "Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Padi (*Oryza sativa L.*) pada Berbagai Sistem Tanam di Kampung Desay, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari", Prosiding Seminar Nasional Pembangunan dan Pendidikan Vokasi Pertanian, 2021 <1 %
- Publication

- 8 Effendy TA, Robby Septiadi, Abdullah Salim, Abdul Mazid. "JAMUR ENTOMOPATOGEN ASAL TANAH LEBAK DI SUMATERA SELATAN DAN POTENSINYA SEBAGAI AGENSIA HAYATI WALANG SANGIT (LEPTOCORISA ORATORIUS (F.))", Jurnal Hama dan Penyakit Tumbuhan Tropika, 2010 <1 %
Publication
-
- 9 Siti Herlinda, Hendri Candro Nauli Manalu, Rinda Fajrin Aldina, Suwandi Suwandi, Andi Wijaya, Khodijah Khodijah, Dewi Meidalima. "KELIMPAHAN DAN KEANEKARAGAMAN SPESIES LABA-LABA PREDATOR HAMA PADI RATUN DI SAWAH PASANG SURUT", Jurnal Hama dan Penyakit Tumbuhan Tropika, 2014 <1 %
Publication
-
- 10 Lia Dwi Ayu Pagarwati, Arif Rohman. "Grandparenting Membentuk Karakter Anak Usia Dini di Masa Pandemi Covid-19", Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 2020 <1 %
Publication
-
- 11 Asyari Asyari. "PENTINGNYA LABIRIN BAGI IKAN RAWA", BAWAL Widya Riset Perikanan Tangkap, 2017 <1 %
Publication
-
- 12 Yusri Sapsuha. "Pengaruh penambahan jenis tepung daun leguminosa yang berbeda <1 %
Publication

terhadap konsumsi, pertambahan bobot badan dan konversi ransum ayam broiler", Agrikan: Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan, 2013

Publication

-
- 13 Bagus Nugraha, Irwan Sukri Banuwa, Setyo Widagdo. "Perencanaan Lanskap Ekowisata Hutan Mangrove Di Pantai Sari Ringgung Desa Sidodadi Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran", Jurnal *Sylva Lestari*, 2015 <1 %
- Publication
-
- 14 Zaka Saputra, Purnomo Purnomo, Nur Yasin, Lestari Wibowo. "PENGARUH APLIKASI BEBERAPA KONSENTRASI FORMULASI KERING Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokin ISOLAT TEGINENENG TERHADAP MORTALITAS HAMA PENGISAP BUAH KAKAO (*Helopeltis spp.*)", Jurnal *Agrotek Tropika*, 2013 <1 %
- Publication
-
- 15 Alex Hendra Kila, Ch. L. Salaki, Elisabeth R.M. Meray. "SERANGAN DAN POPULASI *Scotinophara* sp. PADA TANAMAN PADI SAWAH DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR", *EUGENIA*, 2019 <1 %
- Publication
-
- 16 Darwati Susilastuti, Aditiameri Aditiameri, Ubuh Buchori. "The Effect of Jajar Legowo <1 %

"Planting System on Ciherang Paddy Varieties",
AGRITROPICA : Journal of Agricultural
Sciences, 2018

Publication

-
- 17 Eko Mulyadin. "ANALISIS KOMPARATIF USAHATANI PADI SAWAH TEKNIK JAJAR LEGOWO DAN TEGEL", Jurnal Agrotek Ummat, 2020 <1 %
- 18 Kurnia Hardjanto. "IMPLEMENTASI BUDIDAYA MINA PADI DI KOTA MAGELANG", Chanos Chanos, 2021 <1 %
- 19 Marie Bengtsson. "Plant volatiles mediate attraction to host and non-host plant in apple fruit moth, *Argyresthia conjugella*", Entomologia Experimentalis et Applicata, 1/2006 <1 %
- 20 Rahul Shaw, C Y Maurice Cheung. "Integration of crop growth model and constraint-based metabolic model predicts metabolic changes over rice plant development under water-limited stress", in silico Plants, 2021 <1 %
- 21 Sumini Sumini, Etty Safriyani, Holidi Holidi, Sutejo Sutejo, Samsul Bahri, Riyanto Riyanto. "Penerapan Padi-Itik Pada Berbagai Sistem <1 %

Tanam dalam Mengendalikan Serangga Hama
di Tanaman Padi (*Oryza sativa L*)", Jurnal
Pertanian Terpadu, 2020

Publication

- 22 Yoga Candra Ditya, Aroef Hukmanan Rais,
Syarifah Nurdawati, Ngurah Nyoman
Wiadnyana. "PERANAN LEBUNG SEBAGAI
SUMBER EKONOMI BAGI NELAYAN DAN
SARANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
RAWA BANJIRAN DI SUMATERA SELATAN",
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan
Perikanan, 2015 <1 %
- Publication
-
- 23 Agus Dwi Nugroho, Charisma Ummu Fadlilah,
Ria Puji Astuti, Lendy Vinte Irmania et al.
"Pelaksanaan Program Upaya Khusus (UPSUS)
Swasembada Pangan Berkelanjutan di
Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah",
JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan
Masyarakat), 2018 <1 %
- Publication
-
- 24 Ina Martina, Asep Pebriandi. "Pengaruh Jarak
Tanam pada Sistem Tanam Jajar Legowo
terhadap Produktivitas Padi Varietas Inpari
32", AGRIFOR, 2020 <1 %
- Publication
-
- 25 Lutfi Afifah, Purnama Hidayat, Damayanti
Buchori, Marwoto ., B T Rahardjo. <1 %

"PENGARUH PERBEDAAN PENGELOLAAN AGROEKOSISTEM TANAMAN TERHADAP STRUKTUR KOMUNITAS SERANGGA PADA PERTANAMAN KEDELAI DI NGALE, KABUPATEN NGAWI, JAWA TIMUR", JURNAL HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN TROPIKA, 2015

Publication

- 26 Mahardika Puspitasari, Purnama Hidayat, Pudjianto ., Marwoto ., Bambang Tri Rahardjo. <1 %
"PENGARUH POLA PENGELOLAAN HAMA TERHADAP POPULASI SERANGGA HAMA PADA LAHAN KEDELAI VARIETAS ANJASMORO DAN WILIS", JURNAL HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN TROPIKA, 2017
- Publication
-
- 27 Siti Herlinda, Leny Puspa Rosalina, Yulia Pujiastuti, Erizal Sodikin, Aunu Rauf. <1 %
"POPULASI DAN SERANGAN LIRIOMYZA SATIVAE (BLANCHARD) (DIPTERA: AGROMYZIDAE), SERTA POTENSI PARASITOIDNYA PADA PERTANAMAN KETIMUN", Jurnal Hama dan Penyakit Tumbuhan Tropika, 2005
- Publication
-
- 28 Betty Natalie Fitriatin, Mayang Agustina, Reginawanti Hindersah. "Populasi Bakteri Pelarut Fosfat, P-Potensial Dan Hasil Jagung <1 %

Yang Dipengaruhi Oleh Aplikasi MPF Pada Ultisols Jatinangor", Agrologia, 2017

Publication

-
- 29 Sosiawan Nusifera, JS Simanjuntak, MS Fitriani. "Responses of Several Mungbean (*Vigna radiata L. Wilczek*) Cultivars to Second Nitrogen Fertilization at Early Reproductive Stage", AGROSAINSTEK: Jurnal Ilmu dan Teknologi Pertanian, 2017 <1 %
- Publication
-
- 30 Salawati Salawati, Sjarifuddin Ende, Suprianto Suprianto. "PENGARUH SISTEM TANAM TERHADAP BERAT 1000 BUTIR PADI SAWAH VARIETAS CIGEULIS DAN CIHERANG", AGRIFOR, 2021 <1 %
- Publication
-
- 31 Uzi Yulianti, Yefriwati Yefriwati. "PENGARUH JARAK TANAM TERHADAP PERTUMBUHAN DAN UMBI TANAMAN KENTANG (*Solanum tuberosum.L*) DI BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMETERA BARAT.", HORTUSCOLER, 2020 <1 %
- Publication
-

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 5 words

Exclude bibliography

On