

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang evaluasi rasionalitas penggunaan antibiotik pada pasien pneumonia usia kurang dari 5 tahun di RSI Siti Khadijah Palembang tahun 2016 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Antibiotik yang paling banyak diresepkan oleh dokter adalah seftriakson (49%), sementara seftazidim (22%), sefotaksim (2%), ampicilin (7%), meropenem (13%), kloramfenikol (2%), serta kombinasi ampicilin dengan gentamisin (5%).
2. Antibiotik yang diresepkan oleh dokter memenuhi tepat pasien (100%), tepat indikasi (100%) dari tepat pasien, tepat obat (100%) dari tepat indikasi, dan tepat dosis (85%) dari tepat obat, sehingga didapatkan penggunaan antibiotik secara tepat atau rasional sebesar 85%.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang didapat, maka ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan bagi pembaca dan juga peneliti selanjutnya:

1. Perlu dilakukan penelitian yang mengkaji ketepatan penggunaan antibiotik untuk pengobatan pneumonia pada pasien usia kurang dari 5 tahun secara prospektif sehingga dapat diketahui kajian terapi antibiotik pada pasien rawat inap dan ketika melakukan pengobatan rawat jalan.
2. Perlunya melakukan komunikasi pada dokter untuk mengetahui pertimbangan pengobatan sesuai kondisi penyakit pasien yang sebenarnya.