

tubuh antara cempe yang diberi bioplus dan kontrol dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Suhu Tubuh

Suhu rektal yang diperoleh pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1. Rataan Suhu Tubuh (°C)

Minggu	Bioplus	Kontrol
1	39.99	39.20
2	39.22	39.15
3	38.99	38.84
4	39.09	39.09
5	39.10	38.74
6	38.94	38.62
7	38.79	38.66
8	39.03	39.13
9	39.17	39.25
10	39.20	39.06

Data suhu tubuh pada Tabel 1 bahwa cempe yang diberi bioplus dengan cempe kontrol berbeda tidak nyata secara statistik ( $P>0,05$ ). Cempe yang diberi bioplus atau kontrol diperoleh suhu tubuh yang bervariasi setiap minggunya yaitu suhu tubuh maksimum pada cempe yang diberi bioplus adalah  $39,99^{\circ}\text{C}$  didapat pada minggu ke-1 dan suhu tubuh maksimum cempe kontrol  $39,25^{\circ}\text{C}$  didapat pada minggu ke-9, sedangkan suhu tubuh minimum ternak yang diberi bioplus  $37,76^{\circ}\text{C}$  dan ternak kontrolnya  $37,73^{\circ}\text{C}$ . Rataan suhu tubuh antara cempe yang diberi bioplus dengan cempe kontrol adalah  $39,99^{\circ}\text{C} \pm 0,23$  sampai  $39,25^{\circ}\text{C} \pm 0,38$ . Rataan suhu