

Analisis Faktor Risiko Kejadian penyakit Tuberculosis Bagi Masyarakat Daerah Kumuh Kota Palembang

by Yustini Ardillah

Submission date: 02-Jan-2021 03:36PM (UTC+0700)

Submission ID: 1482454130

File name: JKLI_OKTOBER_2018.docx (90.83K)

Word count: 3402

Character count: 21915

Analisis Faktor Risiko Kejadian penyakit Tuberculosis Bagi Masyarakat Daerah Kumuh Kota Palembang

Iwan Stia Budi¹, Yustini Ardillah¹, Indah Purnama Sari¹, Dwi Septiawati¹

¹ Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya

Corresponding author : Yustini Ardillah, email: yustiniardillah@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang: Tuberculosis atau dikenal dengan TB Paru merupakan penyakit yang mematikan setelah HIV-AIDS. Penyakit ini menjadi epidemik di dunia. Indonesia merupakan Negara dengan urutan kedua di dunia penderita TB Paru setelah India. Tahun 2016 penderita Tuberculosis mengalami peningkatan dari 9,6 juta menjadi 10,5 juta jiwa. Sementara Palembang merupakan Kota dengan prevalensi Tuberculosis tertinggi di provinsi Sumatera Selatan

Metode: Penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan *cross sectional*, sampel penelitian ini adalah masyarakat yang datang ke Puskesmas di Kota Palembang. Teknik sampling menggunakan proporsional random sampling. Analisis data menggunakan *chi-square* dan regresi *logistic* berganda.

Hasil: Analisis statistik secara bivariabel menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara jenis kelamin PR 0.65 (0.45 - 0.80), riwayat TB anggota keluarga PR 2.49 (1.92 - 3.23), akses informasi PR 2.49 (1.92 - 3.23), pencahayaan, kelembapan PR 1.57 (1.10 - 2.23), kondisi atap PR 3.57 (2.38 - 5.34), dinding PR 4.96 (2.98 - 8.27), lantai rumah PR 2.46 (1.86 - 3.22), dengan kejadian penyakit Tuberculosis Paru ($p < 0.05$) dan variabel kepadatan hunian secara bivariat PR 0.76 (0.58 - 1.01). Sedangkan secara multivariabel menemukan bahwa kepadatan hunian merupakan variabel yang paling dominan dengan nilai OR 6.42 (1.55-26.63).

Simpulan: Karakteristik rumah merupakan variabel yang berperan dalam penyebaran penyakit Tuberculosis dan kepadatan hunian merupakan faktor dominan kejadian penyakit tersebut. Surveilans terhadap faktor – faktor risiko lingkungan pada daerah – daerah yang rentan dengan Tuberculosis perlu dilakukan disertai penyuluhan dengan pendekatan keluarga untuk mencegah penyakit Tuberculosis.

Kata kunci: Tuberculosis; faktor risiko; daerah kumuh

ABSTRACT

Title: Analysis of Tuberculosis Risk Factors in Slum Area Palembang

Background: Tuberculosis is a fatal disease after HIV-AIDS. This disease becomes epidemic in the world. Indonesia is the second most populous country in the world of pulmonary tuberculosis patients after India. In 2016, Tuberculosis patients increased from 9,6 million to 10,5 million people. While Palembang Patients TB were the highest one in South Sumatra.

Methods: This research was analytical descriptive with cross sectional approach. Sample was patients who visited Puskesmas in Palembang. The sampling technique used proportional random sampling. Data was analysed through bivariate analysis by *chi-square* and multivariate analysis by *logistic regression*.

Results: Bivariable statistical analysis concluded that there were relationship among sex with PR 0.65 (0.45 - 0.80), family history in family with PR 2.49 (1.92 - 3.23), access to information with PR 2.49 (1.92 - 3.23), lighting, humidity with PR 1.57 (1.10 - 2.23), roof condition with PR 3.57 (2.38 - 5.34), house wall with PR 4.96 (2.98 - 8.27), home floor PR 2.46 (1.86 - 3.22) with incidence of Tuberculosis Lung disease ($p < 0.05$). occupancy density PR 0.76 (0.58 - 1.01) While multivariable found that occupancy density is the most dominant variable with the value of OR 6.42 (1.55-26.63).

Conclusion: house Characteristics were variables that took a role in the spread of Tuberculosis disease and living house density was the dominant factor of the incidence of the disease. Surveillance of environmental risk

factors in vulnerable areas with Tuberculosis should be accompanied by familial counseling to prevent Tuberculosis disease

Keywords: Tuberculosis; Risk factors; slum area

PENDAHULUAN

Tuberculosis atau dikenal dengan TB Paru merupakan penyakit yang mematikan setelah HIV-AIDS. Penyakit ini menjadi epidemic di dunia. Indonesia merupakan Negara dengan urutan kedua tertinggi di dunia penderita TB Paru setelah India. Tahun 2016 penderita Tuberculosis Paru mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dari 9,6 juta jiwa menjadi 10,5 juta jiwa. Sejak tahun 2016, tujuan program Tuberculosis Paru adalah mengakhiri epidemic TB Paru melalui penerapan strategi End TB. Strategi tersebut berupa mengurangi kematian akibat TB Paru sebesar 90% pada tahun 2030 dan memotong kejadian kasus baru TB sebesar 80%.¹

Penyakit tuberkulosis paru adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis* yang sebagian besar menyerang paru-paru. Penderita tuberkulosis paru BTA (+) dapat menularkan pada orang sekelilingnya, terutama yang melakukan kontak erat. Setiap penderita tuberkulosis paru BTA (+) dapat menularkan pada 10-15 orang per tahun. Daya penularan dari seorang penderita tuberkulosis paru BTA (+) ditentukan oleh banyak bakteri yang dikeluarkan dari paru-paru. Kondisi lingkungan dalam rumah yang tidak memenuhi syarat menjadi media penularan penyakit tuberkulosis paru. Faktor lingkungan dalam rumah yang secara statistik berhubungan bermakna dengan kejadian penyakit tuberkulosis paru adalah ventilasi kamar, kelembaban kamar, sinar matahari, dan kepadatan hunian kamar.²

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan membuat sasaran strategis pengendalian TB hingga 2014 mengacu pada rencana strategis yaitu menurunkan prevalensi TB dari 235 per 100.000 penduduk menjadi 224 per 100.000 penduduk. Saat ini diperkirakan ada 1 dari setiap 3 kasus TB yang masih belum terdeteksi oleh program.³ Tahun 2013 WHO memperkirakan di Indonesia terdapat 6.800 kasus baru TB dengan *Multi Drug Resistance* (TB MDR) setiap tahun. Diperkirakan 2% dari kasus TB baru dan 12% dari kasus TB pengobatan pengulangan merupakan kasus TB MDR. Diperkirakan pula lebih dari 55% pasien *Multi Drug Resistant Tuberculosis* (MDR TB) belum terdiagnosis atau mendapat pengobatan yang salah. Rendahnya angka penderita TB di suatu wilayah belum tentu menggambarkan kondisi yang sebenarnya, hal ini bisa disebabkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang belum berani mendiagnosis TB.⁴

Kota Palembang merupakan kota dengan penderita TB paru terbanyak di Sumatera Selatan.⁵ Data TB cure rate dari tahun 2013 ke tahun 2014 terjadi penurunan sebesar 6% yang berarti

keberhasilan dalam penyembuhan pasien TB Paru mengalami penurunan. Walaupun angka keberhasilan penyembuhan TB Paru di Kota Palembang memenuhi standar WHO yaitu diatas 84%. Selain itu, angka penderita TB Paru pada tahun 2014 juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.⁶

Banyak faktor risiko yang mampu memicu timbulnya kejadian Tuberculosis, beberapa diantaranya adalah lingkungan. Faktor lingkungan merupakan salah satu yang mempengaruhi pencahayaan rumah, kelembapan, suhu, kondisi atap, dinding, lantai rumah serta kepadatan hunian. Selain itu faktor selain lingkungan berupa, jenis kelamin, umur, pendapatan, pengetahuan serta sikap terhadap pencegahan TB juga mempengaruhi terjadinya penyakit.^{7, 8}

Berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor risiko kejadian penyakit Tuberculosis di Kota Palembang.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini merupakan observasional analitik dengan rancangan *cross sectional* dengan kelompok pembandingan. Populasi adalah semua pasien Tuberculosis yang berobat di Puskesmas – puskesmas Kota Palembang pada saat penelitian dilakukan yaitu dari bulan April sampai September 2016. Sedangkan kelompok pembandingan adalah tetangga dari pasien Tuberculosis. *Informed consent* dilakukan ketika pasien berada di Puskesmas, kemudian dilakukan kunjungan ke rumah – rumah pasien tersebut.

Sampel penelitian ini berjumlah 192 yang terdiri dari 96 penderita Tuberculosis dan 96 orang tetangga penderita. *Technique sampling* yang digunakan adalah *proportional random sampling*. Daerah Kumuh Palembang merupakan daerah dengan luas wilayah yang kecil dan pemukiman penduduk yang padat, daerah kumuh tersebut beberapa diantaranya merupakan daerah bantaran Sungai Si. Kecamatan yang termasuk daerah kumuh adalah kecamatan Seberang I dan Seberang Ulu II, sehingga responden dalam penelitian ini adalah responden yang berdomisili di dua kecamatan tersebut dan berobat di 7 Puskesmas, yaitu Puskesmas 7 Ulu, 4 Ulu, OPI, Pembina, Nagaswidak, 1 Ulu, taman bacaan.

Variabel penelitian ini berupa karakteristik individu dan keluarga yaitu jenis kelamin, pendapatan keluarga, riwayat keluarga terkena Tuberculosis, akses informasi mengenai TB, paparan rokok di rumah, umur, pengetahuan dan sikap terhadap pencegahan penyakit Tuberculosis. Variabel lainnya yaitu karakteristik lingkungan yang terdiri

dari pencahayaan, kelembapan, suhu, kondisi atap, dinding, dan lantai rumah serta kepadatan hunian.

Variabel karakteristik individu dan keluarga diukur dengan menggunakan kuesioner terstruktur yang sudah dilakukan validasi terlebih dahulu. Responden diukur dengan wawancara oleh tim peneliti. Sementara variabel karakteristik lingkungan diukur dengan menggunakan alat berupa thermohygrometer untuk mengukur kelembapan dan suhu, luxmeter untuk mengukur pencahayaan, dan rollmeter untuk mengukur luas rumah yang menghasilkan variabel kepadatan hunian. Selain itu juga digunakan checklist untuk melakukan penilaian terhadap kondisi rumah berupa atap, dinding dan lantai. Semua pengukuran dengan menggunakan alat – alat yang telah divalidasi.

Data penelitian dianalisis secara deskriptif dan pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji *chi square* sedangkan analisis multivariate menggunakan regresi logistik berganda.


23

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik responden bisa dilihat pada tabel 1, partisipasi responden dalam bentuk umur bisa disimpulkan tidak banyak berbeda. Kedua kategori yang terdiri dari < 40 tahun dan ≥ 40 tahun hanya berselisih 3.4%. kelompok umur yang lebih muda lebih banyak berpartisipasi dalam penelitian ini. Variabel jenis kelamin antara laki – laki dan perempuan yaitu 1:2 atau wanita 2 kali lebih banyak berpartisipasi dalam penelitian ini. Untuk karakteristik pekerjaan, dominasi responden (lebih dari setengah partisipan) lebih banyak yang tidak bekerja. Kategori ibu rumah tangga kami masukkan sebagai kategori yang tidak bekerja. Pendapatan keluarga juga diwawancarai dalam penelitian ini, *cut of point*

kategori pendapatan berdasarkan dari nilai median variabel pendapatan yaitu Rp 1.500.000 dan rumah tangga responden dalam penelitian ini lebih banyak berpendapatan rendah (< Rp 1.500.000).

Risiko dari lingkungan keluarga juga dikaji dari penelitian ini yaitu berupa paparan asap rokok dari keluarga atau penderita sendiri serta riwayat penyakit Tuberculosis dari anggota keluarga. Data tersebut bisa dilihat pada gambar 1. Riwayat Tuberculosis dari anggota keluarga mencapai hampir sepertiga dari responden. Keluarga merupakan orang yang paling sering berinteraksi dengan penderita sehingga menjadi berisiko terkena TB apabila ada anggota keluarga yang terkena penyakit tersebut. Sedangkan paparan asap rokok, baik sebagai *active smoker* ataupun *secondhand smoker* di penelitian ini mencapai 70.3%. Anggota keluarga mendapat paparan asap rokok jika ada anggota keluarga yang merokok.



Gambar 1. Distribusi Faktor Risiko dari Lingkungan Keluarga

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Responden Faktor Risiko Penyakit Tuberculosis Paru di Slum Area Palembang


Variabel	Kategori	Total (n=192)	Presentasi
Sosial demografi			
Umur	< 40 Tahun	99	51.6
	≥ 40 Tahun	93	48.2
Jenis Kelamin	Wanita	131	68.2
	Laki – laki	61	31.8
Pekerjaan	Petani	3	1.6
	Pegawai	75	39.1
	PNS/POLRI	5	2.6
	Pedagang	8	4.2
	Tidak bekerja	101	52.6
Pendapatan keluarga	Rendah	109	76.5
	Tinggi	83	56.8

Gambaran lingkungan fisik rumah bisa dilihat pada gambar 2, variabel – variabel yang diukur adalah pencahayaan, kelembapan, suhu, kondisi atap, dinding dan lantai serta kepadatan hunian yang dikategorikan

dengan standar dan tidak standar, lebih jelas masing – masing nilai *cut of point* setiap variabel dapat dilihat pada tabel 3. Penelitian ini menemukan bahwa rumah – rumah pada pemukiman kumuh lebih banyak yang


tidak memenuhi standar atau syarat, baik dari segi pencahayaan, kelembapan, suhu, kondisi atap, dan dinding serta lantai. Rumah – rumah tersebut juga tidak memenuhi syarat untuk jumlah hunian dalam setiap rumah.

Pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap pencegahan penyakit Tuberculosis juga dikaji dalam penelitian. Penelitian ini menemukan. Gambaran



Gambar 2. Grafik Lingkungan Fisik Rumah

distribusi frekuensi pengetahuan dan sikap bisa dilihat pada gambar 3. Masyarakat lebih banyak yang tidak mempunyai pengetahuan yang baik mengenai penyebab Tuberculosis, penularan serta pencegahan penyakit ini. Sementara sikap mereka lebih banyak yang tidak mendukung dalam upaya – upaya pencegahan penyakit ini.



Gambar 3. Pengetahuan dan Sikap Masyarakat

Analisis bivariate dari penelitian ini menggunakan uji *chi square* dengan variabel bergantung yaitu kejadian penyakit Tuberculosis dan variabel bebas yaitu jenis kelamin, pendapatan keluarga, riwayat Tuberculosis di keluarga, akses informasi, paparan rokok di rumah, pengetahuan dan sikap. Sementara variabel lingkungan fisik rumah terdiri dari kelembapan, pencahayaan, suhu, kondisi, atap, dinding, dan lantai rumah serta kepadatan hunian rumah. Kemudian variabel tersebut dianalisis untuk menguji hubungan dari masing – masing variabel bebas terhadap variabel bergantung. Hasil analisis hubungan dapat dilihat pada tabel 2 dan tabel 3. Tabel 2 menjelaskan hubungan dari variabel – variabel lingkungan keluarga sedangkan tabel 3 menjelaskan hubungan variabel fisik lingkungan rumah.

Hasil analisis secara bivariate menemukan bahwa ada hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian penyakit Tuberculosis dengan nilai kekuatan hubungan (*Prevalence Ratio*) yaitu 0.65 dengan referensi laki – laki dan jika direferensikan wanita dalam variabel ini maka nilai PR menjadi 1.8 yang berarti laki – laki mempunyai kemungkinan 1.8 kali untuk terkena penyakit Tuberculosis atau dengan probabilitas 64%. Di benua Afrika banyak tuberkulosis terutama menyerang laki-laki. Berdasarkan hasil penelitian di Brazil laki-laki lebih besar risikonya untuk terkena Tuberculosis ($OR = 1.82$ 95% CI 1.28, 2.60). Tuberculosis lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan dengan wanita karena laki-laki sebagian besar mempunyai kebiasaan merokok sehingga memudahkan terjangkitnya Tuberculosis.⁹ Merokok diketahui mempunyai hubungan dengan meningkatkan risiko untuk

mendapatkan kanker paru-paru, penyakit jantung koroner, bronchitis kronik dan kanker kandung kemih. Kebiasaan merokok meningkatkan resiko untuk terkena TB paru sebanyak 2,2 kali.¹⁰ Prevalensi merokok pada hampir semua Negara berkembang lebih dari 50% terjadi pada laki-laki dewasa, sedangkan wanita perokok kurang dari 5%. Dengan adanya kebiasaan merokok akan mempermudah untuk terjadinya infeksi Tuberculosis. Beberapa perokok aktif menghentikan kebiasaan merokok mereka ketika mereka menyadari adanya peningkatan keparahan penyakit Tuberculosis yang mereka derita.^{9, 11} Meskipun, penelitian ini tidak menemukan hubungan yang signifikan antara paparan rokok dengan kejadian Tuberculosis, tetapi hasil penelitian ini secara deskriptif bahwa prevalensi rumah tangga dengan paparan asap rokok sebesar 70,3% (gambar 2).

Selain jenis kelamin pada variabel lingkungan keluarga, riwayat Tuberculosis pada anggota keluarga lainnya juga secara statistik signifikan berhubungan terjadinya penyakit Tuberculosis. *Prevalence ratio* sebesar 2.5 yang berarti kemungkinan masyarakat yang mempunyai anggota keluarga yang serumah dan terkena TB untuk tertular Tuberculosis sebesar 2,5 kali. Penelitian sebelumnya Aldridge, Zenner¹¹ menemukan bahwa penularan dari anggota keluarga sangat kuat berhubungan dengan kejadian Tuberculosis. Penularan dapat terjadi melalui udara (*air borne disease*) yang mengandung basil TB dalam percikan ludah yang dikeluarkan oleh Tuberculosis pada waktu mereka batuk, bersin atau pada waktu bernyanyi. Bakteri ini bila sering masuk dan terkumpul di dalam paru-paru akan berkembang biak menjadi banyak (terutama pada orang dengan daya tahan tubuh

yang rendah), dan dapat menyebar melalui pembuluh darah atau kelenjar getah bening. Oleh sebab itulah infeksi TBC dapat menginfeksi hampir seluruh organ tubuh seperti: paru-paru, otak, ginjal, saluran pencernaan, tulang, kelenjar getah bening, dan lain-lain, meskipun demikian organ tubuh yang paling sering terkena yaitu paru-paru.¹²

Akses informasi yang didapatkan masyarakat juga signifikan berhubungan secara statistik untuk kejadian penyakit paru, dengan nilai *Prevalence ratio* 2.4. Masyarakat daerah kumuh yang tidak pernah mendapatkan akses informasi mengenai Tuberculosis berpeluang 2,4 kali terkena penyakit tersebut.

Kurangnya informasi kaitan mengenai Tuberculosis di masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai Tuberculosis. Oleh karena itu ketersediaan dan kemudahan dalam mengakses informasi yang tepat mengenai Tuberculosis merupakan salah satu kunci untuk dapat menurunkan kasus Tuberculosis di masyarakat. Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian yang menyatakan adanya pengaruh komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Tuberculosis pada masyarakat terhadap pengetahuan masyarakat mengenai penyakit Tuberculosis.^{10,13}

Tabel 2. Analisis Statistik Hubungan Variabel Keluarga dengan Penyakit Tuberculosis Paru di Palembang

Variabel	Kategori	Tuberculosis				PR (95% CI)	p-value
		Ya		Tidak			
		n	%	n	%		
Jenis Kelamin	Wanita	43	44.8	67	69.8	0.65 (0.45 - 0.80)	0.01*
	Laki – laki	53	55.2	29	30.2	Referensi	
Pendapatan	Rendah	53	55.2	56	58.3	0.94 (0.71 - 1.25)	0.771
Keluarga	Tinggi	43	44.8	40	41.7	Referensi	
Riwayat TB di keluarga	Ada	51	53.1	9	9.4	2.49(1.92 – 3.23)	0.00*
	Tidak ada	45	46.9	87	96.0	Referensi	
Akses Informasi	Tidak ada	62	64.6	21	72.9	2.39 (1.76 – 3.25)	0.00*
	Ada	34	35.4	70	27.1	Referensi	
Paparan rokok	Ada	65	67.7	26	53.0	0.88 (0.65 - 1.89)	0.53
	Tidak ada	32	32.3	15	46.9	Referensi	
Umur	< 40 tahun	46	47.9	53	55.2	0.86 (0.65 - 1.147)	0.38
	≥ 40 tahun	50	52.1	43	44.8	Referensi	
Pengetahuan	Buruk	54	56.3	62	64.6	0.84(0.64 – 1.12)	0.30
	Baik	42	42.0	34	35.4	Referensi	
Sikap	Tidak mendukung	55	57.3	59	61.5	0.91(0.69 – 1.22)	0.66
	mendukung	41	42.7	37	38.5		

Ket: *(p<0.5)

Hasil analisis hubungan variabel karakteristik rumah terdiri dari pencahayaan, kelembapan, suhu, kondisi atap rumah, dinding dan lantai rumah serta kepadatan hunian dijelaskan pada tabel 3. Penelitian ini menemukan bahwa ada hubungan signifikan secara statistik antara variabel pencahayaan, kelembapan, kondisi atap, dinding dan lantai rumah. Sementara variabel suhu tidak berhubungan secara statistik.

Hasil analisis variabel pencahayaan menunjukkan nilai *Prevalence Ratio* sebesar 1.6. Masyarakat yang tinggal di rumah yang memiliki pencahayaan yang kurang dari 60 Lux berpeluang 1.6 kali untuk terkena Tuberculosis. Sinar matahari berperan secara langsung dalam mematikan bakteri dan mikroorganisme lain yang terdapat di lingkungan rumah, dengan demikian sinar matahari sangat diperlukan di dalam suatu ruangan rumah terutama ruangan tidur, khususnya sinar matahari pagi yang dapat menghambat perkembangan bakteri

tuberkulosis dan kuman penyakit lainnya. Di luar tubuh manusia, *Mycobacterium tuberculosis* hidup baik pada lingkungan yang lembab akan tetapi tidak tahan terhadap sinar matahari. Bakteri tuberkulosis dapat bertahan hidup pada tempat yang sejuk, lembab, gelap tanpa sinar matahari sampai bertahun-tahun lamanya. Tetapi bakteri tuberkulosis akan mati bila terkena sinar matahari, sabun, lisol, karbol dan panas api. Bakteri tuberkulosis jika terkena cahaya matahari akan mati dalam waktu 2 jam, selain itu bakteri tersebut akan mati oleh *tinctura iodi* selama 5 menit dan juga oleh *ethanol* 80 % dalam waktu 2 sampai 10 menit serta oleh fenol 5 % dalam waktu 24 jam.¹⁴

Kelembapan juga secara statistik berhubungan dengan kejadian. Masyarakat yang tinggal di rumah dengan kelembapan yang tinggi berpeluang 2.7 kali untuk terkena Tuberculosis. Bakteri *Mycobacterium tuberculosis* seperti halnya bakteri lain akan tumbuh dengan subur pada lingkungan dengan kelembapan yang tinggi. Air membentuk lebih dari 80% volume

sel bakteri dan merupakan hal esensial untuk pertumbuhan⁷ dan kelangsungan hidup sel bakteri.¹⁵ Menurut¹⁴, kelembaban udara yang meningkat merupakan media yang baik untuk bakteri-bakteri patogen termasuk tuberkulosis.

Kondisi atap rumah, dinding dan lantai signifikan secara berhubungan dengan kejadian²⁹ yakit Tuberculosis. Masyarakat daerah kumuh yang tinggal di rumah dengan atap yang tidak standard akan berpeluang 3,6 kali terkena Tuberculosis dan untuk dinding rumah yang tidak standard berpeluang 4,9 kali serta berpeluang 2,5 kali

untuk terkena Tuberculosis. Rumah atau tempat tinggal yang buruk (kurang baik) dapat mendukung terjadinya penularan penyakit dan gangguan⁵ sehatan, diantaranya adalah infeksi saluran nafas. Kondisi rumah dapat menjadi salah satu faktor resiko penularan penyakit Tuberculosis Paru. atap, dinding dan lantai dapat menjadi tempat berkembang biakan bakteri. Lantai dan dinding yang sulit dibersihkan akan menyebabkan penumpukan debu, sehingga akan dijadikan sebagai media yang baik bagi berkembangbiaknya bakteri *Mycrobacterium tuberculosis*^{14, 15, 16}

11
Tabel.3 Analisis Statistik Hubungan Karakteristik Lingkungan Rumah dengan Kejadian Tuberculosis Paru di Palembang

Variabel	Kategori	16 tuberculosis				PR (95 % CI)	p-value
		Ya		Tidak			
		n	%	n	%		
Pencahayaan	< 60 Lux	72	75.0	54	56.3	1.57 (1.10 – 2.23)	0.01*
	≥ 60 Lux	24	25.0	42	43.8	Referensi	
Kelembapan	> 60 %	77	80.2	38	39.6	2.71 (1.79 – 4.09)	0.00*
	40-60%	19	19.8	58	60.4	Referensi	
Suhu	31-37°C	87	90.6	86	89.6	1.06(0.65 – 1.74)	1.00
	18 – 30 °C	9	9.4	10	10.4	Referensi	
Atap rumah	Tidak standar	76	79.2	23	24.0	3.57 (2.38 – 5.34)	0.00*
	Standar	20	86.5	25	76.0	Referensi	
Dinding rumah	Tidak standar	83	13.5	71	26.0	4.96(2.98 – 8.27)	0.00*
	Standar	13	32.3	15	74.0	Referensi	
Lantai	Tidak Kedap	55	57.3	13	13.5	2.46 (1.86 – 3.22)	0.00*
	Kedap	41	42.7	83	86.5	Referensi	
Kepadatan rumah	< 8 m²/orang	57	59.4	69	71.9	0.76(0.58 – 1.01)	0.09
	≥ 8 m²/orang	39	40.6	27	28.1	Referensi	

Ket: *(p<0.05)

Tahap¹⁹ analisis penelitian ini adalah analisis multivariate dengan menggunakan regresi logistik berganda. Hasil penelitian ini menemukan tiga model yang bisa dilihat pada tabel 4. Variabel yang dimasukkan ke dalam analisis multivariate adalah variabel dengan nilai p< 0.25, dengan hasil pertimbangan tersebut terdapat delapan variabel yang dimasukkan dalam analisis ini. Selain statistik, analisis multivariat juga mempertimbangkan hubungan secara teori. Maka, atas pertimbangan penelitian sebelumnya variabel kepadatan hunian juga dimasukkan sebagai variabel yang akan dianalisis secara multivariat.

Hasil analisis multivariate dengan permodelan menemukan bahwa kepadatan hunian merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi kejadian penyakit Tuberculosis masyarakat di daerah kumuh dengan nilai OR sebesar 6,42. Masyarakat daerah kumuh yang tinggal di rumah dengan kepadatan hunian < 8 m²¹³ berpeluang 6,4 kali terkena Tuberculosis. Tingkat penularan tuberkulosis di lingkungan keluarga penderita cukup tinggi, dimana

seorang pe¹⁰rita rata -rata dapat menularkan kepada 2-3 orang di dalam rumahnya. Luas lantai bangunan rumah sehat harus cukup untuk penghuni didalamnya, artinya luas lantai bangunan rumah tersebut harus disesuaikan dengan jum⁴h penghuninya agar tidak menyebabkan *overload*. Orang yang tinggal di dalam rumah dengan tingkat kepadatan hunian yang ti⁷gi berisiko untuk mudah tertular Tuberculosis 2 kali lebih besar dibandingkan orang yang tinggal di rumah dengan t²ingkat kepadatan hunian yang rendah.²

Rumah dengan tingkat kepadatan hunian yang tinggi tidaklah sehat, sebab disamping menyebabkankurangnya konsumsi oksigen juga bila salah satu anggota keluarga terkena penyakit infeksi, akan mudah menular kepada anggota keluarga yang lain. Persyaratan kepadatan hunian untuk seluruh rumah biasanya dinyatakan dalam m²/orang. Luas minimum per orang sangat relative tergantung dari kualitas bangunan dan fasilitas yang tersedia. Untuk rumah sederhana luasnya minimum 8m²/orang.^{17, 18}

Tabel 4. Analisis Multivariat Faktor Risiko Kejadian Penyakit Tuberculosis Paru

Variabel	Kategori	Model 1	Model 2	Model 3
		OR (95% CI)	OR (95% CI)	OR (95% CI)
Jenis Kelamin	Wanita	2.80 (0.84 - 9.31)	2.90(0.88-9.53)	-
	Laki - laki	Referensi	Referensi	
Anggota keluarga dengan TB	Ada	0.46 (0.10 – 0.20)*	0.47 (0.11 – 0.20)*	0.44 (0.10 – 0.20)*
	Tidak ada	Referensi	Referensi	Referensi
Akses informasi	Tidak pernah	0.93 (0.24 – 0.36)*	0.92 (0.24 – 0.36)*	0.78(0.02-0.29)*
	Pernah	Referensi	Reference	Reference
Pencahayaan	< 60 Lux	0.25 (0.47-1.67)	-	-
	≥ 60 Lux	Referensi		
Kelembapan	> 60%	0.13 (0.03-0.54)*	0.13 (0.03-0.52)*	0.15 (0.04-0.59)*
	40-60%	Referensi	Referensi	Referensi
Atap rumah	Tidak baik	0.07(0.02 – 0.30)*	0.08(0.02 – 0.31)*	0.08(0.02 – 0.31)*
	Baik	Referensi	Referensi	Referensi
Dinding rumah	Tidak standar	0.13(0.03 – 0.56)*	0.13(0.03 – 0.44)*	0.09(0.02 – 0.35)*
	Standar	Referensi	Referensi	Referensi
Lantai rumah	Tidak kedap air	0.06(0.01 – 0.26)*	0.06(0.01 – 0.26)*	0.06(0.01-0.23)*
	Kedap air	Referensi	Referensi	Referensi
Kepadatan rumah	< 8 m ² /orang	6.05(1.27 – 28.65)*	6.05(1.27 28.65)*	6.42(1.55-26.63)**
	≥ 8 m ² /orang	Referensi	Referensi	Referensi

Ket:

*(p<0.05),

**Faktordominan

SIMPULAN

Slum area merupakan daerah dengan keberadaan faktor risiko lingkungan terbanyak untuk terjadinya penyakit Tuberculosis. Penelitian ini menemukan bahwa faktor lingkungan rumah yang terdiri dari pencahayaan, kelembapan, kondisi atap, dinding dan lantai signifikan berhubungan dengan kejadian penyakit Tuberculosis dan kepadatan hunian menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap kejadian penyakit tersebut. Slum area menjadi area yang berpotensi untuk menjadi wilayah penyebaran penderita Tuberculosis dengan keberadaan faktor – faktor lingkungan tersebut. Berdasarkan temuan penelitian ini, maka kami merekomendasikan untuk perlunya pemantauan khusus dari pemerintah setempat tentang keadaan fisik rumah dari masyarakat serta perlu adanya pendekatan khusus seperti pendekatan keluarga untuk menyebarkan informasi mengenai pencegahan penyakit Tuberculosis.

Analisis Faktor Risiko Kejadian penyakit Tuberculosis Bagi Masyarakat Daerah Kumuh Kota Palembang

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Jember

Student Paper

3%

2

Submitted to Universitas Dian Nuswantoro

Student Paper

2%

3

repository.unair.ac.id

Internet Source

2%

4

journal.fkm.ui.ac.id

Internet Source

1%

5

Submitted to University of Muhammadiyah
Malang

Student Paper

1%

6

repository.usu.ac.id

Internet Source

1%

7

jurnal.untan.ac.id

Internet Source

1%

8

Submitted to Universitas Sam Ratulangi

Student Paper

1%

9	ejurnal.stikesbhaktikencana.ac.id Internet Source	1 %
10	Submitted to iGroup Student Paper	1 %
11	eprints.undip.ac.id Internet Source	1 %
12	Submitted to Universitas Indonesia Student Paper	1 %
13	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	1 %
14	jurnal.stikesperintis.ac.id Internet Source	1 %
15	tbc-paru.blogspot.com Internet Source	1 %
16	ejournal.kopertis10.or.id Internet Source	<1 %
17	Submitted to Universitas Respati Indonesia Student Paper	<1 %
18	bmcpublichealth.biomedcentral.com Internet Source	<1 %
19	lib.ibs.ac.id Internet Source	<1 %
20	Submitted to Universitas Muhammadiyah	

21

Submitted to Universitas Airlangga

Student Paper

<1 %

22

j-ptiik.ub.ac.id

Internet Source

<1 %

23

journal.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

<1 %

24

eprints.umm.ac.id

Internet Source

<1 %

25

journal.unair.ac.id

Internet Source

<1 %

26

eprints.perbanas.ac.id

Internet Source

<1 %

27

semnask3.fk.uns.ac.id

Internet Source

<1 %

28

www.ncbi.nlm.nih.gov

Internet Source

<1 %

29

arsip.jurnalrespirologi.org

Internet Source

<1 %

30

eprints.uns.ac.id

Internet Source

<1 %

31

jurnal.fk.unand.ac.id

Internet Source

<1 %

32

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

<1 %

33

www.jurnal.unsyiah.ac.id

Internet Source

<1 %

34

www.kemkes.go.id

Internet Source

<1 %

35

ejournal.unsrat.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On