

Kondisi Klinis dan Determinan Status Gizi Anak dengan HIV/AIDS (ADHA)

by Rico Januar Sitorus

Submission date: 29-Jul-2022 02:23PM (UTC+0700)

Submission ID: 1876488441

File name: manuscript_output_ADHA_1.docx (50.32K)

Word count: 2855

Character count: 16971

Kondisi Klinis dan Determinan Status Gizi Anak dengan HIV/AIDS (ADHA)

Clinical Conditions and Determinants of Nutritional Status of Children with HIV/AIDS (ADHA)

Rico Januar¹, Anita Camelia², Sri Maryatun³, Danny Aerosta⁴, Merry Natalia⁵

^{1,2,4}Fakultas Kesehatan Masyarakat, Univeristas Sriwijaya, Indonesia

³Fakultas Kedokteran, Program Studi Keperawatan, Universitas Sriwijaya, Indonesia

⁵Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang, Indonesia

1

Corresponding Author:

Rico Januar Sitorus

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Univeristas Sriwijaya, Indonesia

Email: rico_januar@fkm.unsri.ac.id

ABSTRACT/ ABSTRAK

12

Globally, nearly 2.6 million children under 15 years of age have been infected with the HIV virus with 40-64% experiencing malnutrition. Children born to HIV-positive mothers with CD4 <200 cells/mm³ are more likely to have poor birth outcomes, increase infant morbidity and mortality and the development of comorbidities. Viral suppression from a young age in children with Perinatal HIV (PHIV) continues to show neurocognitive deficits. This study aims to determine the clinical conditions and determinants of nutritional status of children with HIV/AIDS. This research is a quantitative research with a cross-sectional study design. The study population was pediatric patients with HIV/AIDS who reached health services at M. Hosein Hospital Palembang from 2019 – May 2022 with a total sample of 75 ADHA. The data was analyzed descriptively and bivariately. The results showed the nutritional status of ADHA. The results showed that the nutritional status of ADHA for women was higher than for ADHA for men, but not significantly different with 0.817 > alpha (0.05). In this study, the average nutritional status of ADHA who did not have comorbidities was higher than that of ADHA who had comorbidities. The average difference in nutritional status was statistically significant with p-value 0.018 < alpha (0.05). From this study it can be concluded that the potential risk of HIV transmission to children from a mother with HIV is very high. The impact of HIV on children is the low nutritional status so that it has an impact on opportunistic infections.

Keywords: hiv, aids, child malnutrition, perinatal.

Secara global, hampir 2,6 juta anak kurang dari 15 tahun telah terinfeksi virus HIV dengan 40-64% mengalami malnutrisi. Anak-anak yang lahir dari ibu HIV-positif dengan CD4 <200 cells/mm³ lebih cenderung memiliki hasil kelahiran yang buruk, meningkatkan morbiditas dan mortalitas bayi serta munculnya penyakit penyerta. Penekanan virus sejak usia muda anak-anak dengan HIV Perinatal (PHIV) terus menunjukkan defisit neurokognitif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi klinis dan determinan status gizi Anak dengan HIV/AIDS. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi cross-sectional. Populasi penelitian adalah Pasien anak dengan HIV/AIDS yang menjangkau layanan kesehatan di RS M. Hosein Palembang mulai tahun 2019 – Mei 2022 dengan jumlah sampel sebanyak 75 ADHA. Data dianalisis secara deskriptif dan bivariat. Hasil penelitian menunjukkan status gizi ADHA Perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan ADHA Laki-laki, namun tidak berbeda secara signifikan dengan $0,817 > \alpha (0,05)$. Pada penelitian ini juga diperoleh rata-rata status gizi ADHA yang tidak memiliki penyakit penyerta lebih tinggi dibandingkan dengan ADHA yang memiliki penyakit penyerta. Perbedaan rata-rata status gizi tersebut secara statistik signifikan dengan $p\text{-value } 0,018 < \alpha (0,05)$. Dari penelitian ini dapat disimpulkan potensi risiko penularan HIV pada anak dari seorang Ibu dengan HIV sangat tinggi. Dampak buruk dari HIV pada anak adalah rendahnya status gizi sehingga berdampak pada infeksi oportunistik.

Kata Kunci : hiv, aids, malnutrisi anak, perinatal.

PENDAHULUAN

8

Penularan HIV dari ibu HIV-positif ke anaknya selama kehamilan, persalinan, atau menyusui disebut penularan dari ibu ke anak.(Shaffer *et al.*, 2020) Beban hidup terkait kesehatan Anak dengan HIV sangat berat. Anak-anak yang terinfeksi HIV memiliki risiko berbagai penyakit selama hidupnya seperti diare, TBC, adanya pola bacterimia, memperburuk sistem kekebalan tubuh dan risiko malnutrisi.(Kolo *et al.*, 2015; Rahman, 2016; Acácio *et al.*, 2018)

Secara global, hampir 2,6 juta anak kurang dari 15 tahun telah terinfeksi virus HIV dengan 40-64% mengalami malnutrisi. (Jesson *et al.*, 2015; Fabusoro and Mejia, 2021) Penularan HIV pada anak dapat ditularkan dari Ibu yang terinfeksi HIV.Tingkat penularan vertikal pada bulan pertama kehidupan untuk anak yang lahir dari ibu yang terinfeksi HIV diperkirakan sekitar 9%. (Moraleda *et al.*, 2014)

9

Anak-anak yang lahir dari ibu HIV-positif dengan CD4 <200 cells/mm³ lebih cenderung memiliki hasil kelahiran yang buruk, meningkatkan morbiditas dan mortalitas bayi serta munculnya penyakit penyerta. Perkiraan saat ini adalah bahwa satu dari delapan kasus TB terjadi pada orang yang terinfeksi HIV.(Venturini *et al.*, 2014) Oleh karena itu, konsumsi makanan sehat yang seimbang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.(UNICEF, 2012; Sitorus *et al.*, 2021)

Pedoman WHO saat ini merekomendasikan kombinasi ampicilin dan gentamisin untuk pengobatan empiris bakteremia anak, dengan sefalosporin generasi ketiga direkomendasikan sebagai terapi lini kedua ketika infeksi stafilocokus dicurigai.(Downie *et al.*, 2013; Organization, 2013) Pedoman pengobatan merekomendasikan bahwa anak-anak dengan infeksi HIV perinatal (PHIV) memulai terapi antiretroviral (ART) sejak dini dan tetap menggunakan seumur hidup. Penekanan virus sejak usia muda anak-anak dengan PHIV terus menunjukkan defisit neurokognitif, perubahan otak sepanjang masa kanak-kanak bahkan dengan pengobatan.(Hoare *et al.*, 2014; Musielak and Fine, 2016; Van den Hof *et al.*, 2019)

Orang tua yang terpapar sejumlah stresor yang terkait dengan HIV/AIDS akan mengancam kesejahteraan psikologis anak. Anak-anak yang terkena HIV memiliki peningkatan risiko mengalami kesehatan mental yang buruk, termasuk depresi, kecemasan, kesepian, dan stres.(Chi and Li, 2013) Orangtua dengan HIV harus memiliki perspektif positif dalam menjalani kehidupan sehingga memiliki ketahanan hidup yang panjang, mudah beradaptasi dan dapat memahami

kondisi anak yang tertular.(Harrison and Li, 2018) Tes dan pengobatan dini sangat penting untuk mengurangi mortalitas dan morbiditas.Pengobatan yang tidak teratur pada anak dengan HIV, sebesar 50 % berisiko kematian sampai usia 2 tahun, dan 80 % tidak akan hidup sampai usia 5 tahun. Oleh karena itu, kegagalan untuk menekan HIV tetap menjadi masalah serius di kalangan anak-anak dan diperburuk oleh kurangnya formulasi yang ramah anak dari obat antiretroviral (ARV) terbaru. (Schlatter, Deathe and Vreeman, 2016) Penelitian tentang ADHA sudah banyak dilakukan, tetapi penelitian ini memberikan kontribusi dan informasi yang baru bagaimana kondisi klinis anak dengan HIV.Oleh karena itu penlitian penting dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi klinis dan determinan status gizi Anak dengan HIV/AIDS.

11 METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi crossectional. Populasi penelitian adalah seluruh anak dengan HIV/AIDS yang menjangkau layanan kesehatan di rumah sakit M. Hosein Palembang dan tercatat di rekam medik mulai tahun 2019 – Mei 2022. Jumlah sampel yang diambil adalah total sampel yang memenuhi kriteria inklusi penelitian. Kriteria inklusi dalam penelitian adalah anak dengan HIV/AIDS yang memiliki catatan medik yang lengkap sesuai dengan variabel dalam penelitian. Data rekam medik yang tidak lengkap tidak diikutkan dalam analisis dan dianggap tidak valid. Dari hasil penelusuran rekam medik, data yang memenuhi persyaratan dalam penelitian ini sebanyak 75 responden.

5 Data penelitian dianalisis secara deskriptif dan bivariat. Secara deskriptif, data disajikan untuk mengambarkan karakteristik demografi dan kondisi klinis pasien. Analisis bivariat dilakukan dengan menggunakan uji Mann-Whitney. Uji ini digunakan sebagai alternatif uji T Independen karena data variabel dependen tidak terdistribusi secara normal. Nilai kemaknaan untuk menjawab hipotesis adalah jika tingkat kesalahan pada alpha 5% dan nilai confidence interval ditetapkan 95%. Penelitian ini telah lolos kaji etik dan mendapatkan Keterangan Lolos Kaji Etik dengan Nomor 80/kepkrsmh/2022 dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi responden dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibanding dengan perempuan (58,7 %). Sumber penularan HIV pada anak semuannya (100 %) diperoleh dari Ibu dengan HIV positif dan ditularkan secara perinatal. Berdasarkan stadium penyakit, responden mengalami stadium 1 sampai stadium 4 dimana 20 % penderita sudah pada stadium 4, dan sebanyak 70,7 % tidak diketahui stadiumnya. Berdasarkan kelengkapan orang tua, ada sebanyak 8 %, Ibu ADHA sudah meninggal dunia. Responden penelitian ini memiliki rata-rata usia 6,68 tahun, rata-rata lama terdiagnosa HIV selama 3,55 tahun dan rata-rata kadar cluster diferensiasi 4 (CD4) $265,13 \text{ cells/mm}^3$. (Tabel 1)

Hasil penelitian ini juga menunjukkan sebesar 44 % ADHA mengalami penyerta seperti TB Paru, TB ekstra paru, gizi buruk, gastoenteritis, diare, candidiasis oral, anemia, Infeksi saluran kemih, Infeksi CMV, pneumonia, bronkitis, alergi immunologi, dermatitis, batuk, flu, dan sariawan. Ada ADHA memiliki penyakit penyerta hanya 1 dan mayoritas memiliki penyakit penyerta lebih dari 1. (Tabel 2.)

Berdasarkan uji Mann-Whitney diperoleh bahwa rata-rata status gizi ADHA Perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan ADHA Laki-laki. Perbedaan rata-rata status gizi berdasarkan jenis kelamin tidak berbeda secara signifikan dengan $0,817 > \alpha (0,05)$. Pada penelitian ini juga diperoleh rata-rata status gizi ADHA yang tidak memiliki penyakit penyerta lebih tinggi dibandingkan dengan ADHA yang memiliki penyakit penyerta. Perbedaan rata-rata status gizi tersebut secara statistik signifikan dengan $p\text{-value } 0,018 < \alpha (0,05)$. Tabel 3)

Tabel 1. Karakteristik Demografi Responden

Variabel	n	%
Jenis kelamin		
- Laki-laki	44	58.7
- Perempuan	31	41.3
Sumber Penularan		
- Perinatal	75	100
- Non perinatal	0	0
Stadium		
- Tidak diketahui	53	70.7
- Stadium 1	1	1.3
- Stadium 2	1	1.3
- Stadium 3	15	20
- Stadium 4	5	6.7
Kondisi Ibu		
- Meninggal	6	8.0
- Hidup	69	92.8
		Mean/Median
		Minimum-Maksimum / Stad.Deviasi (SD)
Status Gizi (Z-score)	-1.201/ -0.940	-5.26 - 1.40/1.79
Usia (Tahun)	6.86/5.00	1-18/4,98
Lama terdiagnosa (Tahun)	3.55/2.00	1 – 14/2,97
CD4 (cells/mm ³)	265.13/195.00	8 -662 / 242.950

Tabel 2. Jenis Penyakit Penyerta Responden

Penyakit Penyerta	n	%
- Tidak ada	42	56
- TB Paru	4	5,3
- TB Ekstra paru	2	2,7
- TB Paru dan Gizi buruk	2	2,7
- Gastroenteritis dan diare	1	1,3
- Diare, Candidiasis oral, dan TB Paru	1	1,3
- TB Paru, Gizi buruk dan candidiasis oral	2	2,7
- Anemia, Infeksi saluran kemih, Candidiasis oral, dan Diare	1	1,3
- TB Paru, Gizi buruk, Diare, dan Infeksi CMV	1	1,3
- TB Paru, Gizi buruk, dan Diare		2,7
- Pneumonia, Gizi buruk, dan TB Paru	1	1,3
- Pneumonia	1	1,3
- TB Paru, Infeksi saluran kemih, Gizi buruk, Bronkitis, Candidiasis Oral dan Anemia	1	1,3
- Pneumonia dan Candidiasis oral	1	1,3
- TB Paru, Epilepticus, Hepatitis, Gizi buruk, dan Anemia	1	1,3
- TB Paru, Infeksi CMV, Gizi buruk, Anemia, dan Pneumonia	1	1,3
- Alergi Immunologi	1	1,3
- Dermatitis	1	1,3
- Batuk, flu dan sariawan	2	2,7
- TB Paru, diare, gizi buruk, dan anemia	2	2,7
- TB Paru, hepatitis, dan pneumonia	1	1,3
- Gizi buruk	1	1,3
- Dermatitis, tb paru, gizi buruk, anemia, dan diare	1	1,3
- Gizi buruk, candidiasis oral, diare dan Tb paru	1	1,3
- Anemia dan Gizi buruk	1	1,3

Tabel 3. Analisis Bivariat dengan uji Mann-Whitney

Jenis kelamin	N	Mean Rank	Sum of Ranks	P value
Laki-laki	44	19,20	480.00	0,817
Perempuan	31	20,08	261.00	
Penyakit Penyerta				
Ada	33	17,59	387.00	0,018
Tidak ada	42	22,13	354.00	

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua anak dengan HIV tertular dari Ibu dengan HIV secara perinatal. Penularan dari ibu ke anak dapat terjadi intrauterin (IU),vintrapartum (IP), atau postpartum (PP) terutama melalui menyusui.(Zijenah *et al.*, 2021)Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan bahwa semua wanita hamil yang terinfeksi HIV harus memulai terapi antiretroviral kombinasi (cART) seumur hidup, terlepas dari jumlah CD4nya untuk pengobatan infeksi HIV Ibu. Semua bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi HIV menerima profilaksis nevirapine selama 6 minggu pertama kehidupan⁷ dan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan. WHO juga merekomendasikan bahwa bayi yang lahir dari ibu dengan HIV dites **HIV** pada usia dua bulan, selama menyusui, dan ketika menyusui berakhir karena risiko penularan yang berkelanjutan selama periode ini. (WHO, 2013)

Kehadaan ADHA yang tidak mendapatkan terapi sejak awal akan meningkatkan risiko untuk menderita komorbiditas atau penyakit penyerta. Salah satu penyakit penyerta yang dialami adalah Gizi buruk. ADHA terbukti berhubungan dengan gizi buruk (manutrisi). Gizi buruk dapat mempercepat perkembangan HIV menjadi AIDS dan menyumbang 35 % kematian.(Lodha and Kabra, 2015) Hubungan antara infeksi HIV dan malnutrisi sangat kompleks. Status gizi buruk yang disebabkan oleh infeksi HIV mempercepat proses penyakit penyerta seperti Tuberkulosis (TB), malaria, atau diare kronis. Anak-anak dengan infeksi HIV memerlukan suplementasi nutrisi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan metabolisme mereka yang meningkat.(Matara, Mukona and Zvinavashe, 2015)

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebesar 8 % ADHA kehilangan Ibu meninggal karena HIV. Hal ini sejalan dengan penelitian di Nigeria bahwa 20 % ADHA kehilangan Ibu, 25 % kehilangan Ayah dan 50 % diantara mereka kehilangan kedua orangtua karena HIV.(Fagbamigbe, Adebowale and Ajayi, 2019) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa stadium yang diderita adalah stadium 1 – 4 dengan proporsi paling banyak adalah stadium 3 yaitu 20 %. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Mirna, dimana penderita AIDS paling banyak dengan stadium 3 yaitu 40 %. (Widiyanti and Sandy, 2016) WHO menetapkan empat stadium klinis HIV yaitu stadium 1 (asimtotik),stadium 2 (sakit ringan),stadium 3 (sakit sedang)¹⁴ dengan penyakit HIV lanjut dan stadium 4 (sakit berat) dengan AIDS. Berdasarkan jumlah CD4, jika jumlah CD4 \leq 200 sel disebut kondisi HIV stadium IV, dan jumlah CD4 <350 sel/mm³ sudah menandakan bahwa seseorang tersebut terinfeksi HIV.(WHO, 2015)

SIMPULAN

Potensi risiko penularan HIV pada anak dari seorang Ibu dengan HIV sangat tinggi. Pada penelitian ini ADHA tertular dari Ibu dengan HIV secara perinatal. ADHA yang tertular dari Ibu mayoritas sudah sampai pada stadium 3 yang menggambarkan tingkat keparahan penyakit ini. Dampak buruk dari HIV pada anak adalah rendahnya status gizi sehingga berdampak pada infeksi oportunistik. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang terus menerus pada Ibu selama kehamilan untuk melakukan anc dengan teratur sesuai dengan frekuensi yang dianjurkan pada Ibu dengan hiv. ANC yang teratur dan Kepatuhan minum obat dapat megurangi risiko penularan dari secara perinatal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Acácio, S. *et al.* (2018) ‘The role of HIV infection in the etiology and epidemiology of diarrheal disease among children aged 0–59 months in Manhiça District, Rural Mozambique’, *International Journal of Infectious Diseases*, 73, pp. 10–17.
- Chi, P. and Li, X. (2013) ‘Impact of parental HIV/AIDS on children’s psychological well-being: A systematic review of global literature’, *AIDS and Behavior*, 17(7), pp. 2554–2574.
- Downie, L. *et al.* (2013) ‘Community-acquired neonatal and infant sepsis in developing countries: efficacy of WHO’s currently recommended antibiotics—systematic review and meta-analysis’, *Archives of disease in childhood*, 98(2), pp. 146–154.
- Fabusoro, O.K. and Mejia, L.A. (2021) ‘Nutrition in HIV-Infected Infants and Children: Current Knowledge, Existing Challenges, and New Dietary Management Opportunities’, *Advances in Nutrition*, 12(4), pp. 1424–1437.
- Fagbamigbe, A.F., Adebowale, A.S. and Ajayi, I. (2019) ‘An assessment of the nutritional status of ART receiving HIV-orphaned and vulnerable children in South-West Nigeria’, *Heliyon*, 5(12), p. e02925. doi:<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02925>.
- Harrison, S. and Li, X. (2018) ‘Toward an enhanced understanding of psychological resilience for HIV youth populations’, *AIDS care*, 30(sup4), pp. 1–4.

- Hoare, J. *et al.* (2014) 'Systematic review of neuroimaging studies in vertically transmitted HIV positive children and adolescents', *Metabolic brain disease*, 29(2), pp. 221–229.
- Van den Hof, M. *et al.* (2019) 'Brain structure of perinatally HIV-infected patients on long-term treatment: A systematic review', *Neurology: Clinical Practice*, 9(5), pp. 433–442.
- Jesson, J. *et al.* (2015) 'Prevalence of malnutrition among HIV-infected children in Central and West-African HIV-care programmes supported by the Growing Up Programme in 2011: a cross-sectional study', *BMC infectious diseases*, 15(1), pp. 1–12.
- Kolo, O.O. *et al.* (2015) 'Bacteremia in Children Infected with HIV/AIDS in Minna, Niger State, Nigeria', *Br Microbiol Res J*, 9(2), pp. 1–7.
- Lodha, R. and Kabra, S.K. (2015) 'Children, Health & nutritional status of HIV infected', *Indian J. Med. Res*, 141(1), pp. 10–12.
- Matara, F., Mukona, D. and Zvinavashe, M. (2015) 'Factors contributing to malnutrition among HIV positive children aged between 6 and 60 months', *J Nurs Health Sci*, 4(1), p. 2320.
- Moraleda, C. *et al.* (2014) 'Impact of HIV exposure on health outcomes in HIV-negative infants born to HIV-positive mothers in Sub-Saharan Africa', *JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes*, 65(2), pp. 182–189.
- Musielak, K.A. and Fine, J.G. (2016) 'An updated systematic review of neuroimaging studies of children and adolescents with perinatally acquired HIV', *Journal of Pediatric Neuropsychology*, 2(1), pp. 34–49.
- Organization, W.H. (2013) *Pocket book of hospital care for children: guidelines for the management of common childhood illnesses*. World Health Organization.
- Rahman, A. (2016) 'Significant risk factors for childhood malnutrition: evidence from an Asian developing country', *Sci J Public Health*, 4(1–1), pp. 16–27.
- Schlatter, A.F., Deathe, A.R. and Vreeman, R.C. (2016) 'The need for pediatric formulations to treat children with HIV', *AIDS Research and treatment*, 2016.
- Shaffer, N. *et al.* (2020) 'WHO's path to elimination of mother-to-child transmission of HIV and syphilis', *BMJ*, 368.
- Sitorus, R.J. *et al.* (2021) 'Determinan Kadar Cluster Diferensiasi 4 (CD4) pada Orang dengan HIV/AIDS', *Jurnal Kesehatan; Vol 12, No 1 (2021): Jurnal KesehatanDO* - 10.26630/jk.v12i1.2423 [Preprint]. Available at: <https://ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JK/article/view/2423>.

- UNICEF (2012) ‘What is the role of nutrition’.
- Venturini, E. *et al.* (2014) ‘Tuberculosis and HIV co-infection in children’, *BMC infectious diseases*, 14(1), pp. 1–10.
- WHO (2015) ‘Guideline on when to start antiretroviral therapy and on pre-exposure prophylaxis for HIV’, *World Health Organization* [Preprint].
- WHO, G. (2013) ‘Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection: recommendations for a public health approach’, *Geneva: World Health Organization*, pp. 1–272.
- Widiyanti, M. and Sandy, S. (2016) ‘Gambaran Subtipe HIV-1 dengan kadar CD4, Stadium Klinis, dan Infeksi Oportunistik Penderita HIV/AIDS di Kota dan Kabupaten Jayapura, Papua’, *Majalah Kedokteran Bandung*, 48(1), pp. 1–6.
- Zijenah, L.S. *et al.* (2021) ‘Mother-to-child transmission of HIV-1 and infant mortality in the first six months of life, in the era of Option B Plus combination antiretroviral therapy’, *International Journal of Infectious Diseases*, 109, pp. 92–98.
doi:<https://doi.org/10.1016/j.ijid.2021.06.036>.

Kondisi Klinis dan Determinan Status Gizi Anak dengan HIV/AIDS (ADHA)

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|--|----|
| 1 | Submitted to Sriwijaya University
Student Paper | 2% |
| 2 | Noëlle van Biljon, Frances Robertson, Martha Holmes, Mark F Cotton et al. "Multivariate approach for longitudinal analysis of brain metabolite levels from ages 5-11 years in children with perinatal HIV infection.", <i>NeuroImage</i> , 2021
Publication | 1% |
| 3 | www.scilit.net
Internet Source | 1% |
| 4 | media.neliti.com
Internet Source | 1% |
| 5 | ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id
Internet Source | 1% |
| 6 | happylibnet.com
Internet Source | 1% |
| 7 | www.slideshare.net
Internet Source | 1% |

8	hes-gotappointment-newspaper.icu Internet Source	1 %
9	www.ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id Internet Source	1 %
10	Aeltsje Brinksma, Gea Huizinga, Esther Sulkers, Willem Kamps, Petrie Roodbol, Wim Tissing. "Malnutrition in childhood cancer patients: A review on its prevalence and possible causes", Critical Reviews in Oncology/Hematology, 2012 Publication	1 %
11	Submitted to Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Student Paper	1 %
12	Freida D. Intiful, Hikmatu Abdulai, Ruth Nyarko, Edem Tette, Matilda Asante. "Malnutrition in HIV infected children on antiretroviral drugs in a cohort of Ghanaian children", Heliyon, 2021 Publication	1 %
13	repository.usd.ac.id Internet Source	1 %
14	www.pdf-archive.com Internet Source	1 %
15	www.repository.ufc.br Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%